





# ツロブテロールテープ「YP」の貼り方

- 

切り口が**2箇所**あります。両方とも切って、テープを取り出してください。  
※0.5mg, 1mg, 2mgのいずれも使い方は同じです。
- 

「フィルム」と表示された面を上にして、**山折り**にしてください。
- 

片方のフィルムを半分ほど浮かせ、浮いたフィルムの端をつまみ、はがしてください。この時、**テープを左右に強くひっぱらない**よう注意してください。また、**粘着面に指がふれない**よう注意してください。
- 

もう片方のフィルム面を持ってテープを貼り、**軽く押さえ**、フィルムをずらしながら、残りのテープを貼ってください。この時、テープがカールするおそれがありますので、フィルムをあまり強くひっぱらないでください。
- 

貼ったあとは、手のひらで全体をしっかりと**押さえて**ください。

## 保管上の注意

- ☆使用する前までは、袋を開けず、高温を避けて保管してください。
- ☆子供の手の届かないところに保管してください。

## 使用方法の注意

このテープは、あなたの症状に合わせて処方されたお薬です。  
主治医又は薬剤師の指示に従って正しく使用してください。  
※このテープを家族や他の人にあげてはいけません。


### 貼る回数

このテープは1日1回、必ず貼りかえてください。


### 貼る部位

☆このテープは、胸、上腕、背中のいずれか1箇所に貼ってください。


胸



上腕



背中



- ☆貼る部位は乾いたタオル等でよく拭き、清潔にして使用してください。
- ☆このテープをはがしてしまう可能性のある子供には、手の届かないところに貼ってください。
- ☆傷口や湿疹のある部位には貼らないでください。
- ☆汗をかきやすい部位や、クリーム、軟膏等をぬった部位は、はがれやすくなるので貼らないでください。
- ☆同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、かぶれたりすることがありますので、新しいテープに貼りかえる時は、同じところを避けて貼ってください。

### 貼る時に注意すること

- ☆テープからフィルムをはがす時、強くひっぱらないでください。強すぎると破れたり、カールしたりするおそれがあります。
- ☆粘着面に指がふれると粘着力が低下して、うまく貼れないことがあります。
- ☆テープは一度はがしたら、再び貼り直すことができません。
- ☆テープが少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定してください。

※このテープを使って、何か変だと感じるがあった時は、主治医又は薬剤師に相談してください。