

* 2020年9月改訂（第1版、効能変更）

貯 法：室温保存
有効期間：3年

日本標準商品分類番号

872399

	2.5mg	5mg
承認番号	22400AMX01062000	22400AMX01063000
販売開始	2012年12月	2012年12月

消化管運動機能改善剤**日本薬局方 モサプリドクエン酸塩錠****モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」****モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」****Mosapride Citrate Tablets 2.5mg・5mg "Chemiphar"****3. 組成・性状****3.1 組成**

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」
有効成分 (1錠中)	(日局) モサプリドクエン酸 塩水和物2.645mg (モサプリドクエン酸塩として 2.5mg)	(日局) モサプリドクエン酸 塩水和物5.29mg (モサプリドクエン酸塩として 5mg)
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ビプロメロース、ケエン酸トリエチル、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ	

3.2 製剤の性状

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」
性状	白色のフィルム コーティング錠	白色の割線入りフィルム コーティング錠
外形	表 	裏
	側面 	側面
直径	5.6mm	長径 9.1mm 短径 4.6mm
厚さ	2.9mm	3.6mm
重量	71.2mg	140mg
識別コード	NCP 2.5	NC P5

***4. 効能又は効果**

- 慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐）
- 経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助

***5. 効能又は効果に関する注意**

（経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助）
塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム及び無水硫酸ナトリウム含有経口腸管洗浄剤（ニフレック配合内用剤）以外の経口腸管洗浄剤との併用による臨床試験は実施されていない。[17.1.2参照]

6. 用法及び用量*（慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐））**

通常、成人には、モサプリドクエン酸塩として1日15mgを3回に分けて食前または食後に経口投与する。

（経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助）

通常、成人には、経口腸管洗浄剤の投与開始時にモサプリドクエン酸塩として20mgを経口腸管洗浄剤（約180mL）で経口投与する。また、経口腸管洗浄剤投与終了後、モサプリドクエン酸塩として20mgを少量の水で経口投与する。

7. 用法及び用量に関する注意**（慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐））**

一定期間（通常2週間）投与後、消化器症状の改善について評価し、投与継続の必要性について検討すること。

8. 重要な基本的注意

8.1 劇症肝炎や重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、長期にわたって漫然と投与しないこと。また、患者に対し、本剤投与後に倦怠感、食欲不振、尿濃染、眼球結膜黄染等の症状があらわれた場合は、本剤を中止し、医師等に連絡するよう指導すること。[11.1.1参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.5 妊婦**

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験（ラット）で乳汁への移行が報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に腎機能、肝機能等の生理機能が低下している。なお、慢性胃炎に伴う消化器症状に用いる際に、副作用が発現した場合には、減量（例えば1日7.5mg）するなど適切な処置を行うこと。

10. 相互作用**10.2 併用注意（併用に注意すること）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗コリン作用を有する薬剤 アトロピン ブチルスコポラミン等	本剤の作用が減弱する可能性があるので、抗コリン剤を服用する場合は、服用間隔をあけるなど注意すること。	本剤の消化管運動の促進作用は、コリン作動性神経の賦活により発現するため、抗コリン剤の併用により本剤の作用が抑制される。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用**11.1.1 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）**

劇症肝炎、著しいAST、ALT、γ-GTPの上昇等を伴う重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがあり、死亡に至った例もある。[8.1参照]

11.2 その他の副作用*（慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐））**

過敏症	1～2%未満	1%未満	頻度不明
血液	好酸球增多	白血球減少	発疹、じん麻疹
消化器	下痢・軟便	口渴、味覚異常、腹痛、嘔吐	嘔気、腹部膨満感、口内しづれ感（舌、口唇等を含む）
肝臓		AST、ALT、ALP、γ-GTP、ビリルビンの上昇	
循環器		心悸亢進	
精神神経系		めまい・ふらつき、頭痛	
その他	中性脂肪の上昇	倦怠感	振戦

（経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助）

消化器	1～5%未満	1%未満
肝臓	腹部膨満感、嘔気、腹痛	胃部不快感、おくび
精神神経系	頭痛	ビリルビンの上昇
その他	尿潜血、尿蛋白	眼瞼
		胸部不快感、寒気、倦怠感、顔面腫脹、LDHの上昇

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.2 非臨床試験に基づく情報

げっ歯類に臨床通常用量の100～330倍（30～100mg/kg/日）を長期間経口投与した試験（ラット104週間、マウス92週間）において、腫瘍（肝細胞腺腫及び甲状腺滤胞性腫瘍）の発生率の上昇が認められた。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単独投与時

（健康成人5例、空腹時本剤5mg 1回経口投与）¹⁾

Tmax (h)	Cmax (ng/mL)	T _{1/2} (h)	AUC _{0~∞} (ng · h/mL)
0.8±0.1	30.7±2.7	2.0±0.2	67±8

平均値±標準誤差

* 16.1.2 経口腸管洗浄剤併用時

（健康成人、空腹時本剤20mg（1回目）経口投与後、経口腸管洗浄剤（ニフレック配合内用剤）を服用し、1回目の投与から2時間後本剤20mg（2回目）経口投与）²⁾

投与時期	Tmax (h)	Cmax (ng/mL)	AUC (ng · h/mL)
1回目（24例）	1.0±0.5	116.1±35.1	150.3±45.2 (0~2)
2回目（23例）	2.5±0.2	272.6±80.9	848.8±301.4 (0~24)


平均値±標準偏差

16.1.3 生物学的同等性試験

モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」とガスマチン錠5mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（モサブリドクエン酸塩として5mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80)～log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0~12} (ng · h/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (h)	T _{1/2} (h)
モサブリド クエン酸塩錠 5mg「ケミファ」	56.54±23.91	31.20±12.08	0.7±0.4	1.90±0.49
ガスマチン錠5mg	59.04±26.83	29.53±11.09	0.8±0.4	1.84±0.57

(Mean±S.D., n=30)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.3 分布

16.3.1 血清蛋白結合率

99.0% (*in vitro*、ヒト血清、1μg/mL、限外ろ過法又は平衡透析法)⁴⁾

16.4 代謝

16.4.1 主な代謝産物

4-フルオロベンジル基脱離体¹⁾

16.4.2 代謝経路

主として肝臓で4-フルオロベンジル基の脱離、これに続くモルホリン環5位の酸化及びベンゼン環3位の水酸化によって代謝される^{1,5)}。

16.4.3 代謝酵素

主としてCYP3A4⁶⁾

16.5 排泄

16.5.1 排泄経路

尿中、糞便中

16.5.2 排泄率

投与後48時間までの尿中排泄率は、未変化体として0.1%、主代謝物（4-フルオロベンジル基脱離体）として7.0%であった¹⁾（健康成人、空腹時本剤5mg 1回投与）。

16.7 薬物相互作用

16.7.1 エリスロマイシン

本剤15mg/日にエリスロマイシン1,200mg/日を併用したところ、単独投与時に比べて、モサブリドの最高血漿中濃度は42.1ng/mLから65.7ng/mLに上昇し、半減期は1.6時間から2.4時間に延長し、AUC_{0~4}は62ng · h/mLから114ng · h/mLに増加した⁷⁾（健康成人）。

16.8 その他

モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた³⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

（慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐））

17.1.1 国内臨床試験

二重盲検比較試験111例についての臨床成績は次のとおりである⁸⁾。

対象疾患/症状	改善率
慢性胃炎	胸やけ 68.5% (37/54)
	悪心・嘔吐 71.2% (37/52)

（経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助）

* 17.1.2 国内第Ⅲ相試験

バリウム注腸X線造影検査の前処置におけるプラウン変法との比較試験は、計99例を対象として実施された。その結果、本剤と経口腸管洗浄剤（ニフレック配合内用剤）併用群の「右大腸バリウムの付着性スコア」及び「右大腸便残渣の量スコア」について、プラウン変法群に劣らないことが確認された。[5.参照]

群	プラウン 変法群	本剤とニフレック配合 内用剤との併用群
右大腸バリウムの付着性スコア	9.4±1.0	9.3±1.5
右大腸便残渣の量スコア	9.2±1.5	10.8±1.6

平均値±標準偏差、各群46例

スコア：右大腸（横行結腸、上行結腸、盲腸）の「バリウムの付着性」及び「便残渣の量」について、部位毎に5段階評価し、3部位の点数を合計したもの（最高：15点、最低：3点）。

安全性評価対象48例（本剤とニフレック配合内用剤との併用群）中8例（16.7%）に副作用がみられた。発現頻度が5%以上であった副作用は、腹部膨満3例（6.3%）であった⁹⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤は選択的なセロトニン5-HT₄受容体アゴニストであり、消化管内在神経叢に存在する5-HT₄受容体を刺激し、アセチルコリン遊離の増大を介して上部及び下部消化管運動促進作用を示すと考えられている^{10~12)}。

18.2 上部消化管運動促進作用

18.2.1 胃、十二指腸運動促進作用

用量依存的に、食後期の胃、十二指腸運動促進作用を示す¹⁰⁾（イヌ）。

18.2.2 胃排出促進作用

- 健康成人¹³⁾及び慢性胃炎患者¹⁴⁾を対象とした胃排出試験において、本剤5mg 1回投与で胃排出促進作用を示す。
- 液体物の胃排出促進作用（マウス、ラット）及び固形物の胃排出促進作用（ラット）を示す。なお、1週間の反復投与で胃排出促進作用は減弱する^{11,15)}（ラット）。

18.3 下部消化管運動促進作用

18.3.1 結腸運動及び内容物輸送促進作用

用量依存的に結腸運動及び内容物輸送促進作用を示す^{12,16)}（モルモット）。

* 18.3.2 結腸内の洗浄増強効果及び水分重量減少作用（経口腸管洗浄剤併用時）

経口腸管洗浄剤（ニフレック配合内用剤）投与による結腸内の洗浄効果を増強し、さらに結腸内の水分重量を減少する¹⁶⁾（モルモット）。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：モサプリドクエン酸塩水和物 (Mosapride Citrate Hydrate)


化学名：4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-{ [(2RS)-4-(4-fluorobenzyl) morpholin-2-yl] methyl} benzamide monocitrate dihydrate

分子式： $C_{21}H_{25}ClFN_3O_3 \cdot C_6H_8O_7 \cdot 2H_2O$

分子量：650.05

性状：白色～帯黃白色の結晶性の粉末である。 N,N -ジメチルホルムアミド又は酢酸(100)に溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、エタノール(99.5)に溶けにくく、水にほとんど溶けない。 N,N -ジメチルホルムアミド溶液(1→20)は旋光性を示さない。

化学構造式：



22. 包装

〈モサプリドクエン酸塩錠2.5mg 「ケミファ」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

〈モサプリドクエン酸塩錠5mg 「ケミファ」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

1,000錠 [10錠 (PTP) × 100]

1,050錠 [21錠 (PTP) × 50]

1,000錠 [ポリエチレン瓶、パラ]

23. 主要文献

- 1) Sakashita M., et al. : Arzneim.-Forsch. / Drug Res. 1993 ; 43 : 867-872
- 2) 降旗謙一ほか：診療と新薬. 2009 ; 46 : 262-271
- 3) 日本ケミファ株式会社：生物学的同等性に関する資料（社内資料）
- 4) Matsumoto S., et al. : Arzneim.-Forsch. / Drug Res. 1993 ; 43 : 1084-1094
- 5) Matsumoto S., et al. : Arzneim.-Forsch. / Drug Res. 1993 ; 43 : 1095-1102
- 6) 代謝酵素（ニフレック内用、ガスマチン錠5mg、ガスマチン錠2.5mg、ガスマチン散：2009年4月22日承認、CTD2.6.4）
- 7) 加藤貴雄ほか：臨床医薬. 1999 ; 15 : 753-763
- 8) 三好秋馬ほか：臨床医薬. 1998 ; 14 : 1037-1053
- 9) 杉野吉則ほか：日本大腸検査学会雑誌. 2008 ; 25 : 99-114
- 10) Yoshida N., et al. : J. Pharmacol. Exp. Ther. 1991 ; 257 : 781-787
- 11) 薬効薬理（ニフレック内用、ガスマチン錠5mg、ガスマチン錠2.5mg、ガスマチン散：2009年4月22日承認、CTD2.6.2）
- 12) Inui A., et al. : Jpn. J. Pharmacol. 2002 ; 90 : 313-320
- 13) 金泉年郁ほか：日本平滑筋学会雑誌. 1990 ; 26 : 161-174
- 14) 須山哲次ほか：内科宝函. 1993 ; 40 : 175-183
- 15) 日本薬剤師研修センター編：医薬品服薬指導情報集〔薬効別〕追補版2. 2005 : 437-446
- 16) Mine Y., et al. : J. Pharmacol. Sci. 2009 ; 110 : 415-423

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ケミファ株式会社 安全管理部

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目2-3

TEL 0120-47-9321 03-3863-1225

FAX 03-3861-9567

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

