

質問	モンテルカスト細粒 4mg を調製ミルクやおかゆに混ぜた場合の安定性は？
回答	<p>モンテルカスト細粒 4mg を調製ミルクやおかゆに混ぜた場合は放置せず 15 分以内に服用して下さい。</p> <p>モンテルカスト細粒 4mg を室温の調製ミルク（はぐくみ、ほほえみ、すこやか M1）、おかゆへ配合した際の安定性を確認した結果、類縁物質の増加が、放置 15 分後までは規格内でしたが放置 20 分後には規格外となっています。</p> <p>【添付文書の記載】（一部抜粋）</p> <p><6. 適用上の注意（一部抜粋）></p> <p>（2）本剤は口に直接入れるか、スプーン 1 杯程度の柔らかい食物（室温以下）と混ぜて服用することができます。またスプーン 1 杯（約 5mL）の調製ミルク又は母乳（室温以下）と混ぜて服用することもできる。本剤服用後は水などの飲み物を摂取してもよい。</p> <p>（3）本剤は光に不安定であるため、服用の準備ができるまで開封しないこと。柔らかい食物、調製ミルク又は母乳と混ぜた場合も、放置せずに直ちに（15 分以内に）服用すること。</p>
参考資料	【モンテルカスト細粒 4mg「ケミファ」】 配合後の安定性に関する資料