


リバーロキサバンOD錠「TCK」を 服用されるお子さまとそのご家族へ

本資材は体重30kg以上の静脈血栓塞栓症のお子様を対象としています。



製造販売元：辰巳化学株式会社

販売元： 日本ケミファ株式会社

目次

- Q1** リバーロキサバンOD錠「TCK」は
どのようなおくすりですか？……………3
- Q2** リバーロキサバンOD錠「TCK」は
どのように服用しますか？……………4
- Q3** 飲み忘れたときはどうすればよいですか？…………… 4, 5
- Q4** どのような副作用が起こりやすくなりますか？…………… 6, 7
- Q5** 出血したらどうすればよいですか？……………8
- Q6** 出血を避けるために心がけることは何ですか？……………9
- Q7** リバーロキサバンOD錠「TCK」では、
他にどのような症状が起こりますか？…………… 10, 11
- Q8** リバーロキサバンOD錠「TCK」の服用中、
気をつけることはありますか？…………… 12
- 連絡先情報…………… 13
- 服薬カレンダー……………14-19


Q1

リバーロキサバンOD錠「TCK」は
どのようなおくすりですか？

A

リバーロキサバンOD錠「TCK」は血を固まり
にくくして、血管の中で血が固まる病気(静
脈血栓塞栓症)を治療したり予防したりする
おくすりです。

じょうみやくけっせんそくせんしょう かし じょうし
静脈血栓塞栓症は、下肢(ふくらはぎや太もも)や上肢(う
で)、頭や肺などの血管に血栓ができて、つまってしまう
病気です。リバーロキサバンOD錠「TCK」は、血を固まり
にくくするおくすり(抗凝固薬)で、すでにできている血栓
を小さくして、新たに血栓ができるのを防ぎます。



Q2 リバーロキサバンOD錠「TCK」はどのように服用しますか？

A 主治医または薬剤師に指示された量と回数を守り、空腹時を避けて飲んでください。

リバーロキサバンOD錠15mg*「TCK」

体重30kg以上：1日1回 1回1錠 食後に服用

毎日、なるべく同じ時刻に



*主治医の判断により、リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」や同じ成分の他の剤形(ドライシロップなど)のお薬を服用することもあります。1回の服用量と1日の服用回数は主治医または薬剤師の指示に従ってください。


※リバーロキサバンOD錠「TCK」には以下の剤形があります。

製品名	対象	特徴	製品写真
リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」	体重30kg以上	水なしでも服用できます	
リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」			

Q3 飲み忘れたときはどうすればよいですか？

A 飲み忘れた場合は、以下のように対応してください。

同日中であれば、気づいたときに直ちに^{ただ}服用してください。次の服用まで12時間以上空けてください。同日に服用できない場合は、次の服用時に1回分を服用してください。一度に2回分を服用しないでください。



? 吐き出したり、嘔吐したりして飲めなかった場合は…？

服用から吐き出したり嘔吐するまでの時間によって、以下のように対応してください。

服用から30分以内の場合

1回分をもう一度服用してください。ただし吐き気や嘔吐の症状を繰り返す場合は、すぐに主治医に連絡してください。

服用から30分以上経過している場合

もう一度服用したりしないで、次回の服用時に1回分を服用してください。

指示されたとおり服用できないことが何度か続いたり、吐き出しや嘔吐を繰り返したりする場合は、主治医に相談してください。

翌日からは24時間の服用間隔をできる限り守り服用してください。

Q4 どのような副作用が起こりやすくなりますか？

A

鼻や歯ぐきからの出血、皮下出血(あおあざ)が
女兒の場合は、月経時の出血量が増えることが
ときに重大な出血が起こるおそれもありますの

起こりやすくなります。
あります。
で、服用中は十分に注意してください。

よく見られる出血

● 鼻血



● 歯ぐきからの出血



● 皮下出血
(あおあざがしやすい)



● 月経過多* (出血量が増える
ことがある)
* 女兒の場合



これらの症状が出て、ご自身の判断で服用をやめたり、
飲む回数を減らしたりしないでください。
症状が気になる場合は、主治医と相談してください。

重大な出血時の主な症状

● ひどい頭痛



● 血便(血液の色や黒い色の便)
● 血尿



● 悪心(吐き気) ● 嘔吐



このような症状が現れた場合は、脳や内臓など見えない部位
で出血が起こっている可能性があります。
すぐに主治医に連絡してください。

Q5 出血したらどうすればよいですか？

A 出血が気になる場合は、
すぐに主治医に連絡してください。

主治医から指示があるまでの家庭でできる止血対策

- ケガなどによる出血しゅっけつのとき

グッと
10分間



清潔なタオルでおさえるあっぱくしけつ (圧迫止血)

- 鼻血はなぢのとき

つまんで
5分間



うつまいて鼻はなをつまむ

Q6 出血を避けるために
心がけることは何ですか？

A 普段の生活の中で次の点に注意してください。

- 歯はブラシは
柔らかやわかめのものを
- 鼻はなをかむときは
やさしく



- ケガのおそれがある作業さぎょうや運動うんどうは
なるべく避けさけましょう



Q7 リバーロキサバンOD錠「TCK」では、他にどの

ような症状が起こりますか？

A 皮膚が黄色っぽくなる、息が切れる、尿の量が


減るなどの症状が、まれに出ることがあります。

● おうだん かん き のうしようがい
黄疸などの肝機能障害

けんたいかん
倦怠感(からだがだるい)



おうだん
黄疸(白目や皮膚が黄色くなる)



● きゅうせいじんしょうがい
急性腎障害

にょうりょうてい か
尿量低下
(尿が出ない、量が少ない)



ふしゆ
浮腫(顔や手足がむくむ)



● かんしつせいはいしつかん
間質性肺疾患

こきゅうこんなん
呼吸困難
(日常動作で呼吸が苦しい、
息が切れる)



からせき たん
空咳(痰が出ない乾いた咳)



このような症状が現れた場合は、
すぐに主治医に連絡してください。

Q8

リバーロキサバンOD錠「TCK」の服用中、
気をつけることはありますか？

A

次のようなことがある場合は、
必ず事前に相談してください。


- 1 発熱や咳などの症状で他の病院で治療を受ける場合
- 2 歯の治療を受ける場合
- 3 外科的手術を受ける場合
- 4 他の病院や歯科で他のおくすりを処方された場合や
市販薬を購入する場合

また、他の病院や歯科で治療を受ける際は、おくすり手帳などを
活用し、抗凝固薬を服用中であることを伝えてください。

必ず事前に
伝えて
ください。



主治医



他の病院や歯科

連絡先情報

ふりがな				続柄
保護者の氏名				
保護者の連絡先 (電話番号)	自宅			
	携帯			
ふりがな				
お子さまの氏名				
お子さまの 生年月日	年	月	日	

病院名				
ふりがな				
主治医名				
主治医連絡先				

服薬カレンダー

記入例

日付	飲んだ時間	メモ
12 / 17 (水)	8 : 00	嫌がらずに飲めた

日付	飲んだ時間	メモ
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		

飲み忘れを防ぐためには



ノートやカレンダーにしるしを付けて服薬状況を記録する



冷蔵庫など家の中の目立つ場所にメモを貼る



時計や携帯電話のアラームをセットする

日付	飲んだ時間	メモ
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		
/ ()		

