

# リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 を服用される患者様へ

## のみ方とご注意

このお薬は**毎日1回1錠8週間**のむ  
骨ページェット病のお薬です。

- のみ忘れた場合には、翌日の朝に1錠をのんでください。  
ただし、食べ物、飲み物を口にしていない場合、他のお薬を  
のんでいない場合には、すぐおのみください。
- 同じ日に2錠をのまないでください。
- 下記のような症状や異常を感じた場合には、すぐに主治医または  
薬剤師にご相談ください。
  - ・食べ物のみ込みにくい、のみ込むときにのどが痛い、胸に  
痛みを感じる など
  - ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が  
黄色くなる など
  - ・あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき  
など
- 歯医者さんで診察を受ける場合は、必ずこの紙を見せてください。**  
(歯科・歯科口腔外科の先生方へ:本剤はビスフォスフォネート系薬剤です)

**毎日1回1錠8週間、下記の手順でのんでください。**

- 朝起きたら(食事の前に)1錠をコップ1杯(約180cc)の水道水か  
ぬるま湯でのんでください。
- のんでから少なくとも30分間は、水以外の飲食はせず、他の  
お薬ものまないでください。
- のんでから少なくとも30分間は、横にならないでください。
- このお薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。

 日本ケミファ株式会社  日本薬品工業株式会社