

リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 を服用されている方へ

このお薬は**週1回1錠**をのむ骨粗しょう症のお薬です

- このお薬の服用により下記のような症状や異常を感じた場合は、すみやかに主治医、看護師、薬剤師にご相談ください。
 - ・食べ物がのみ込みにくい、のみ込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
 - ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など
 - ・あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など
- 歯科治療を受けられる方**は、必ず歯科医、口腔外科医にこの紙を見せてください。
(歯科・口腔外科の先生方へ:本剤はビスフォスフォネート系薬剤です)

●このお薬は**毎週1回1錠**を決められた曜日にのんでください(毎日のむお薬ではありません)。

●のみ忘れた場合には、気付いた日の翌朝に1錠をのんでください。次からは、あらかじめ決められた曜日にのんでください。

●同じ日に2錠をのまないでください。

●**朝**、起きたとき(食事前)に、1錠をコップ1杯(約180cc)の**水道水**かぬるま湯でのんでください。

●のんでから**30分間は横にならず、水以外の飲食、他のお薬の服用はさけて**ください。

●このお薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。