


# 使用上の注意改訂のお知らせ

平成23年7月



持続性選択H<sub>1</sub>受容体拮抗・  
アレルギー性疾患治療剤

処方せん医薬品

## セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」 セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」

日本薬局方 セチリジン塩酸塩錠

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記製品の「使用上の注意」の記載内容を下記のとおり自主改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

敬具

### 記

#### <改訂内容 (2011年7月改訂)>

\_\_\_\_\_ : 改訂箇所

1. [禁忌]の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

改訂後	改訂前
<p>●禁忌 (次の患者には投与しないこと)</p> <p>(1)本剤の成分又はピペラジン誘導体 (レボセチリジン、ヒドロキシジンを含む) に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>(2)重度の腎障害 (クレアチンクリアランス 10mL/min未満) のある患者 [高い血中濃度が持続するおそれがある。]</p>	<p>●禁忌 (次の患者には投与しないこと)</p> <p>本剤の成分又はヒドロキシジンに対し過敏症の既往歴のある患者</p>

2. 「用法及び用量に関連する使用上の注意」を新設し、以下の記載を追記致しました。

改訂後	改訂前															
<p>&lt;用法及び用量に関連する使用上の注意&gt;</p> <p>腎障害患者では、血中濃度半減期の延長が認められ、血中濃度が増大するため、クレアチンクリアランスに応じて、下表のとおり投与量の調節が必要である。</p> <p>なお、クレアチンクリアランスが10mL/min未満の患者への投与は禁忌である。</p> <p>成人患者の腎機能に対応する用法及び用量の目安 (外国人データ)</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="4">クレアチンクリアランス (mL/min)</th></tr><tr><th></th><th>≥80</th><th>50~79</th><th>30~49</th><th>10~29</th></tr></thead><tbody><tr><th>推奨用量</th><td>10mgを 1日1回</td><td>10mgを 1日1回</td><td>5mgを 1日1回</td><td>5mgを 2日に1回</td></tr></tbody></table>		クレアチンクリアランス (mL/min)					≥80	50~79	30~49	10~29	推奨用量	10mgを 1日1回	10mgを 1日1回	5mgを 1日1回	5mgを 2日に1回	記載なし
	クレアチンクリアランス (mL/min)															
	≥80	50~79	30~49	10~29												
推奨用量	10mgを 1日1回	10mgを 1日1回	5mgを 1日1回	5mgを 2日に1回												

3. [慎重投与] の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。(該当部分のみ抜粋)

改訂後	改訂前
<b>1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)</b> (1)腎障害のある患者 [高い血中濃度が持続するおそれがある。(「用法及び用量に関連する使用上の注意」の項参照)]	<b>1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)</b> (1)腎障害のある患者 [高い血中濃度が持続するおそれがある。]

4. [相互作用] の「併用注意」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

改訂後			改訂前		
<b>3. 相互作用</b> <b>併用注意 (併用に注意すること)</b>			<b>3. 相互作用</b> <b>併用注意 (併用に注意すること)</b>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
テオフィリン	併用により、テオフィリンの薬物動態に変化はないが、セチリジン塩酸塩の曝露量の増加が報告されている。	機序は明らかではないが、セチリジン塩酸塩のクリアランスが16%減少する。	ピルシカイニド塩酸塩水和物	併用により両剤の血中濃度が上昇し、ピルシカイニド塩酸塩水和物の副作用が発現したとの報告がある。	機序は明らかではない。
リトナビル	併用により、セチリジン塩酸塩の曝露量の増加(40%)及びリトナビルの曝露量のわずかな変化(-11%)が報告されている。	リトナビルによりセチリジン塩酸塩の腎排泄が阻害される可能性が考えられる。			
中枢神経抑制剤 アルコール	中枢神経系に影響を与える可能性があるため、中枢神経抑制剤あるいはアルコールと併用する際は注意すること。	中枢神経抑制作用が増強される可能性がある。			
ピルシカイニド塩酸塩水和物	併用により両剤の血中濃度が上昇し、ピルシカイニド塩酸塩水和物の副作用が発現したとの報告がある。	機序は明らかではない。			

5. [副作用] の「その他の副作用」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。(該当部分のみ抜粋)

改訂後		改訂前	
<b>4. 副作用</b> (2)その他の副作用		<b>4. 副作用</b> (2)その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
精神神経系	眠気、倦怠感、頭痛、頭重感、ふらふら感、しびれ感、めまい、浮遊感、不眠、振戦、抑うつ、激越、攻撃性、無力症、錯感覚、幻覚、不随意運動、意識消失、健忘	精神神経系	眠気、倦怠感、頭痛、頭重感、ふらふら感、しびれ感、めまい、浮遊感、不眠、振戦、抑うつ、激越、攻撃性
眼	結膜充血、霧視、眼球回転発作	眼	結膜充血、霧視
腎臓・泌尿器	尿蛋白、BUN上昇、尿糖、ウロビリノーゲンの異常、頻尿、血尿、排尿困難、遺尿	腎臓・泌尿器	尿蛋白、BUN上昇、尿糖、ウロビリノーゲンの異常、頻尿、血尿、排尿困難
その他	耳鳴、月経異常、胸痛、ほてり、息苦しさ、関節痛、手足のこわばり、嗅覚異常、鼻出血、脱毛、咳嗽、体重増加、筋肉痛	その他	耳鳴、月経異常、胸痛、ほてり、息苦しさ、関節痛、手足のこわばり、嗅覚異常、鼻出血、脱毛、咳嗽

6. [妊婦、産婦、授乳婦等への投与] の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

改訂後	改訂前
<p><b>6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与</b></p> <p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。 [動物実験(ラット)で胎盤を通過することが報告されている。]</p> <p>(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。 [ヒト乳汁中へ移行することが報告されている。]</p>	<p><b>6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与</b></p> <p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。 [妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]</p> <p>(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。 [動物実験(ラット、イヌ)で乳汁中へ移行することが報告されている。]</p>

7. [過量投与] の項を新設し、以下の記載を追記致しました。

改訂後	改訂前
<p><b>9. 過量投与</b></p> <p><b>徴候、症状</b>：本剤の過量投与により錯乱、散瞳、落ち着きのなさ、鎮静、傾眠、昏迷、尿閉があらわれることがある。</p> <p><b>処置</b>：必要に応じ対症療法を行うこと。本剤の特異的な解毒剤はなく、また本剤は透析で除去されない。</p>	記載なし

上記の改訂内容を踏まえ、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

以上

《今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報(DSU) No.201 (2011年7月)に掲載される予定です。》  
※下記以降に改訂後の「使用上の注意」の全文を掲載致しましたので、併せてご参照ください。

**セチリジン塩酸塩錠5mg[NPI]・セチリジン塩酸塩錠10mg[NPI]**  
**改訂後の使用上の注意**

※2011年7月改訂

**●禁忌 (次の患者には投与しないこと)**

- ※ (1) 本剤の成分又はピペラジン誘導体 (レボセチリジン、ヒドロキシジンを含む) に対し過敏症の既往歴のある患者
- ※ (2) 重度の腎障害 (クレアチンクリアランス10mL/min未満) のある患者  
[高い血中濃度が持続するおそれがある。]

※ (用法及び用量に関連する使用上の注意)

腎障害患者では、血中濃度半減期の延長が認められ、血中濃度が増大するため、クレアチンクリアランスに応じて、下表のとおり投与量の調節が必要である。  
なお、クレアチンクリアランスが10mL/min未満の患者への投与は禁忌である。

成人患者の腎機能に対応する用法及び用量の目安 (外国人データ)

	クレアチンクリアランス (mL/min)			
	≥80	50~79	30~49	10~29
推奨用量	10mgを 1日1回	10mgを 1日1回	5mgを 1日1回	5mgを 2日に1回

**●使用上の注意**

1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- ※ (1) 腎障害のある患者  
[高い血中濃度が持続するおそれがある。(「用法及び用量に関連する使用上の注意」の項参照)]
- (2) 肝障害のある患者  
[高い血中濃度が持続するおそれがある。]
- (3) 高齢者  
[高い血中濃度が持続するおそれがある (「5. 高齢者への投与」の項参照)。]
- (4) てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者  
[痙攣を発現するおそれがある。]

2. 重要な基本的注意

- (1) 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。
- (2) 本剤を季節性の患者に投与する場合は、好発季節を考慮して、その直前から投与を開始し、好発季節終了時まで続けることが望ましい。
- (3) 本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないように注意すること。

### 3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
※ テオファイリン	併用により、テオファイリンの薬物動態に変化はないが、セチリジン塩酸塩の曝露量の増加が報告されている。	機序は明らかではないが、セチリジン塩酸塩のクリアランスが16%減少する。
※ リトナビル	併用により、セチリジン塩酸塩の曝露量の増加(40%)及びリトナビルの曝露量のわずかな変化(-11%)が報告されている。	リトナビルによりセチリジン塩酸塩の腎排泄が阻害される可能性が考えられる。
※ 中枢神経抑制剤 ※ アルコール	中枢神経系に影響を与える可能性があるため、中枢神経抑制剤あるいはアルコールと併用する際は注意すること。	中枢神経抑制作用が増強される可能性がある。
ピルシカイニド塩酸塩水和物	併用により両剤の血中濃度が上昇し、ピルシカイニド塩酸塩水和物の副作用が発現したとの報告がある。	機序は明らかではない。

### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (1) 重大な副作用（頻度不明）

##### 1) ショック、アナフィラキシー様症状

ショック、アナフィラキシー様症状（呼吸困難、血圧低下、蕁麻疹、発赤等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 2) 痙攣

異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 3) 肝機能障害、黄疸

AST (GOT)、ALT (GPT)、 $\gamma$ -GTP、LDH、Al-Pの上昇等の肝機能障害（初期症状：全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気等）、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 4) 血小板減少

血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### (2) その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

	頻度不明
※ 精神神経系	眠気、倦怠感、頭痛、頭重感、ふらふら感、しびれ感、めまい、浮遊感、不眠、振戦、抑うつ、激越、攻撃性、無力症、錯覚、幻覚、不随意運動、意識消失、健忘
消化器	口渇、嘔気、食欲不振、胃不快感、下痢、消化不良、腹痛、腹部不快感、胃痛、口唇炎、便秘、口唇乾燥感、嘔吐、味覚異常、口内炎、腹部膨満感

	頻度不明
循環器	動悸、血圧上昇、不整脈（房室ブロック、期外収縮、頻脈、発作性上室性頻拍、心房細動）
血液	好酸球増多、好中球減少、リンパ球増多、白血球増多、白血球減少、単球増多、血小板増加、血小板減少
過敏症	発疹、蕁麻疹、浮腫、かぶれ、痒痒感、血管浮腫、多形紅斑
※ 眼	結膜充血、霧視、眼球回転発作
肝臓	ALT (GPT) 上昇、AST (GOT) 上昇、総ビリルビン上昇、Al-P 上昇
※ 腎臓・泌尿器	尿蛋白、BUN上昇、尿糖、ウロビリノーゲンの異常、頻尿、血尿、排尿困難、遺尿
※ その他	耳鳴、月経異常、胸痛、ほてり、息苦しさ、関節痛、手足のこわばり、嗅覚異常、鼻出血、脱毛、咳嗽、体重増加、筋肉痛

### 5. 高齢者への投与

本剤は、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多く、高い血中濃度が持続するおそれがあるので、低用量（例えば5mg）から投与を開始するなど慎重に投与し、異常が認められた場合は減量又は休薬するなど適切な処置を行うこと。

### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

※(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

[動物実験（ラット）で胎盤を通過することが報告されている。]

※(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。

[ヒト乳汁中へ移行することが報告されている。]

### 7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。

### 8. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤は、アレルゲン皮内反応を抑制するため、アレルゲン皮内反応検査を実施する3～5日前より本剤の投与を中止することが望ましい。

### ※ 9. 過量投与

**徴候、症状：**本剤の過量投与により錯乱、散瞳、落ち着きのなさ、鎮静、傾眠、昏迷、尿閉があらわれることがある。

**処置：**必要に応じ対症療法を行うこと。本剤の特異的な解毒剤はなく、また本剤は透析で除去されない。

### 10. 適用上の注意

**薬剤交付時：**PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。

[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]