



ウラリット配合錠の保管について 夏場の分包にはご注意ください！



ウラリット配合錠は吸湿性が高い為、梅雨～夏場の湿度が高まる時期は、**PTP包装のまま**患者様にお渡しください。


高湿度下(25℃・75%R.H.)における保存形態毎の硬度変化※



25℃・75%R.H. 下において、分包の状態では保管した場合、2ヶ月目より錠剤形状の変化を認め、それ以降、硬度が著しく低下しました。同一条件で、PTPのまま保存した場合は、3ヶ月経過しても硬度低下を認めませんでした。

高温多湿の時期に分包の状態では保管した場合、錠剤に亀裂などが生じることがあります。



40℃・75%R.H.における分包品の硬度及び形状の変化※



夏場を想定した40℃・75%R.H. 下において、分包の状態では保管した場合、3日目に膨張、7日目に亀裂を認めました。

やむを得ず分包を選択される場合には、
乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫(通常20~30%R.H.)^{注)}などで保管する
 よう、患者様にご指導ください。注) 高湿度冷蔵庫(70%R.H.以上)はお避けください。

40℃・75%R.H. における分包品の保存状態毎の変化※



分包品のままでは、7日目に亀裂が生じましたが、乾燥剤と共にお茶缶の中に保存した場合、1ヶ月間は硬度が保たれました。
 なお、チャック付きビニル袋は1週間程度であれば、硬度が保たれました。



季節によって、分包時の錠剤の安定性が異なります。
高温多湿の時期は分包調剤をお避けください。
 やむを得ず分包される場合は、保管方法など患者様へのご指導をお願いします。
 なお、錠剤が吸湿しても含量低下は認められておりません。
 又、水などに溶解して服用戴くことも可能です※。

※日本ケミファ株式会社 社内資料

患者様へ分包品の保管方法をご指導戴くにあたり、右記のようなチップをご用意しています。
 必要に応じて以下のお問い合わせ先、または弊社担当MR宛にご要望ください。

お問い合わせ先:
 日本ケミファ株式会社 くすり相談室
 フリーダイヤル: 0120-47-9321
 TEL: 03-3863-1225

 **日本ケミファ株式会社**

ウラリット配合錠を服用される患者様へ **高温と湿気にご注意ください!**

本剤は高温多湿な場所で保管すると軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避けください。
 乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

S-1450
 2012年6月

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451

ウラリット配合錠を服用される患者様へ

高温と湿気にご注意ください！

本剤は高温多湿な場所で保管すると
軟らかくなったり、変形することがあります。

保管の際は、湿度の高い場所をお避け
ください。

乾燥剤と共にお茶缶の中や、冷蔵庫などに
保管戴くとより湿気を防ぐことができます。

S-1451