



胃の治療で
SOX、CapeOX療法を
受ける方へ

目次

SOX、CapeOX療法 安全に投与を受けるために	3
SOX、CapeOX療法 治療スケジュール	4
SOX、CapeOX療法 おくすり	6
SOX、CapeOX療法 副作用とその対策	7
予想される主な副作用	7
治療中の注意	8
注射部位の反応／アレルギー反応	9
アナフィラキシーショック	10
口の周りのしびれ・疼痛	11
手足のしびれ	12
白血球減少（感染症）・ヘモグロビン減少（貧血）・ 血小板減少（出血傾向）	13
吐き気・嘔吐・食欲不振	15
下痢	16
口内炎	17
皮膚の障害	18
流涙（涙が出る）	19
重大な副作用 間質性肺炎（呼吸困難）	20
服用ダイアリー	21

安全に投与を受けるために

治療を受ける前の確認事項

以下に当てはまる項目があればチェックして、必ず注射の前に担当医や看護師、薬剤師に伝えてください。

また、以下の項目は毎回の治療の前にチェックしてください。

チェック

- オキサリプラチンやその他の白金製剤の治療を受けたことがある。
- 以前に使用した薬（飲み薬、注射薬、坐薬、塗り薬、貼り薬など）や食べ物で「発疹」や「かゆみ」などの症状が出たことがある。
- 手足や口などにしびれがある、文字が書きにくい、ボタンをかけにくい、飲みこみにくい、歩きにくいなどの症状がある。
- いつもより体調が悪い。
- 風邪をひいている、熱がある。
- 腎臓、肝臓、肺、心臓の病気がある。
- 現在、服用している薬（市販の薬、サプリメントも含めて）がある。
- 妊娠・授乳中である、もしくは妊娠している可能性がある。