

FOLFOX

FOLFIRI

CapeOX

# もくじ

オキサリプラチンの治療について	3
大腸がんの代表的な化学療法	7
外来化学療法について	9
副作用について	10
・治療を受けているときの注意点 注射部位の反応／アレルギー反応	11
・アナフィラキシーショック	12
・口の周りのしびれ・疼痛	13
・手足のしびれ	14
・吐き気・嘔吐	15
・白血球減少・血小板減少・感染症・貧血	16
・下痢	17
・口内炎	18
・味覚障害	19
・爪の変化	20
・皮膚の障害	21
・肝障害・腎障害	22
・筋肉の痛み	22
・間質性肺炎（呼吸困難）	23
・疲労感・だるさ	24
Q&A	25

# オキサリプラチンの治療について

## 治療を受ける前の確認事項

以下に当てはまる項目があればチェックして、必ず注射の前に担当医や看護師、薬剤師に伝えてください。

また、以下の項目は毎回の治療の前にチェックしてください。

### チェック

- オキサリプラチンやその他の白金製剤の治療を受けたことがある。
- 以前に使用した薬（飲み薬、注射薬、坐薬、塗り薬、貼り薬など）や食べ物で「発疹」や「かゆみ」などの症状が出たことがある。
- 手足や口などにしびれがある、文字が書きにくい、ボタンをかけにくい、飲みこみにくい、歩きにくいなどの症状がある。
- いつもより体調が悪い。
- 風邪をひいている、熱がある。
- 腎臓、肝臓、肺、心臓の病気がある。
- 現在、服用している薬（市販の薬、サプリメントも含めて）がある。
- 妊娠・授乳中である、もしくは妊娠している可能性がある。

# オキサリプラチンの治療について

## オキサリプラチンの副作用と起こる時期

オキサリプラチンの治療で起こりやすい副作用は下記の通りです。なお、副作用の合併症や症状を軽減することができます。

		経過	当日	1週
点滴部位反応・急性の吐き気・アレルギー反応・血圧低下・不整脈・呼吸困難	参照ページ P11・12			
吐き気・嘔吐	参照ページ P15			
口の周りのしびれ・疼痛	参照ページ P13			
手足のしびれ	参照ページ P14			
白血球減少・血小板減少・感染症・貧血	参照ページ P16			
肝障害・腎障害	参照ページ P22			
筋肉の痛み	参照ページ P22			
口内炎・下痢	参照ページ P17・18			
爪の変化、皮膚の障害	参照ページ P20・21			
味覚障害	参照ページ P19			



起こりやすさや症状・時期には個人差があります。適切な副作用の治療を行うことで、

