

リバストグミンテープ^{4.5mg / 9mg 13.5mg / 18mg}「YP」の使い方

医師の指示に従って正しく使用してください。

【注意事項】

- ・この説明書は大切に保管してください。
- ・処方された患者さん以外はお使いにならないようお願いいたします。

リバストグミンテープ「YP」は、有効成分を皮膚から吸収させるようにしたお薬(テープ)で、もの忘れや判断力の低下などの症状の進行を遅らせる働きがあります。作用は24時間持続します。

お薬の使用スケジュール・種類について

- ▶このお薬は、1日1回貼り替えてください。
- ▶このお薬は4種類の大きさがあり、面積が大きくなるほどお薬の含有量(4.5mg, 9mg, 13.5mg, 18mg)が多くなっています。

※テープ表面にはボールペンなどで日付を記入することができます。

リバストグミンテープ「YP」

実物大



お薬の含有量

4.5mg


包装の色

桃色



9mg

だいだい色



13.5mg

黄緑色




18mg

紫色

お薬を貼るところ


- ▶右の図で示した部位のいずれか1ヵ所に貼ってください。
- ▶背中、上腕または胸の正常な皮膚に貼ってください。
- ▶傷や湿疹などのある部位は避けてください。
- ▶清潔で乾燥した部位、体毛が少ない部位、密着した衣服を着用してもこすれにくい部位に貼ってください。
- ▶オイル、ローション、パウダー、クリームなどが塗られていない部位、テープが良く貼れる部位に貼ってください。



貼るときの注意

- ▶前回とは異なる部位(離れた部位)に貼ってください。
- ▶一度に2枚以上を貼らないように、まず前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼ってください。
- ▶お薬は、毎日ほぼ同じ時間に貼り替えてください。
- ▶このお薬は切って使うことはできません。
- ▶入浴後に貼る場合は、水分をよく拭き取り、乾いてから貼ってください。

このお薬の貼り方




1 お薬を包装から取り出す

中のテープを傷つけないように、切り口に従って封を切り、テープを取り出してください。




2 日付を書き込む

テープの表面にボールペンなどで「貼る当日の日付」を書き込んでください。



3 透明フィルムをはがす

テープには透明フィルムがついています。粘着面に触れないように、はがしてください。



4 お薬を貼る


粘着面を背中、上腕、胸のいずれかにあて、残りの透明フィルムを剥がしてください。テープがしっかりとくっつくまで手のひらで押してください。

使い終わったお薬の捨て方

▶ゆっくりと優しく皮膚からはがしてください。

▶はがしたテープには、まだお薬の成分が残っていますので粘着面を内側にして半分に折ってください。必ず、子供の手や目の届かない場所に廃棄してください。

▶テープをはがした後は、はがした手で目に触れることがないように注意し、石鹼で手を洗ってください。



保管上の注意

▶このお薬は1枚ずつ包装されています。包装は貼る直前まで開封しないでください。

▶このお薬は子供の手や目の届かない場所で保管してください。

▶高温にならない場所で保管してください。

その他の注意

- ▶貼り忘れたときは、その時点で貼ってください。翌日からは、いつもと同じ時間に貼り替えてください。
貼り替えていないことに気付いた場合でも、**一度に2回分を貼らないでください。**
- ▶4日間以上貼っていない期間がある場合は、お薬の量を減らすことがありますので、お薬を貼る前に主治医にご相談ください。
- ▶貼ったお薬がはがれたときは、残っている新しいお薬を貼り、翌日からはいつもと同じ時間に貼り替えてください。はがれたお薬は上記の「使い終わったお薬の捨て方」に従って、廃棄してください。
- ▶このお薬を開始した時または增量した時にめまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転など、危険をともなう機械の操作はしないでください。
- ▶主な副作用として、お薬を貼った部位の皮膚症状(赤くなる、かゆみなど)、嘔吐、悪心などが報告されています。
- ▶このお薬を使用して体調不良などを感じることがあれば、主治医や薬剤師にご相談ください。

詳しい使用方法や副作用については、主治医や薬剤師におたずねください。

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社