

# セレコキシブ錠100mg・200mg「ケミファ」 を服用される患者さんへ

あなたがお飲みになる薬は  チェック 済みです。



セレコキシブ錠100mg「ケミファ」



セレコキシブ錠200mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)



錠剤(原寸大)



## この薬は下記の病気によって起こる 腫れや痛みを抑える薬です。

- かんせつ 関節リウマチ
- へんけいせいかんせつしやう 変形性関節症
- ようつうしやう 腰痛症

- かたかんせつしゆういえん 肩関節周囲炎
- けいけんわんしやうこうぐん 頸肩腕症候群
- けん・けんしやうえん 腱・腱鞘炎

## 以下の症状を感じたら、服薬をやめて すぐに医師または薬剤師にお伝えください。

- 胸の痛み(数分で消失する痛みの場合でも、医師にご相談ください)
- 息切れ、呼吸困難
- ろれつがまわらない
- 体の片側または一部がまひする

## 次のような方は使う前に必ず医師または 薬剤師に相談してください。

- 過去に薬を飲んで発疹や喘息症状が出たことがある人
- 胃潰瘍などの胃腸の病気がある人
- 心臓、肝臓または腎臓の病気がある人
- 過去に心臓のバイパス手術などを受けたことがある人
- 現在、妊娠中または授乳中の人
- 現在、他の薬を飲んでいる人

## 服用について

- 通常、1日2回、朝食後と夕食後にお飲みください。
- 飲み忘れた場合は、その回の服用は避けて、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- めまいや傾眠(ぼんやりする)などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う作業は十分注意してください。
- ご自分の判断で服用を中止したり量を加減しないでください。
- 痛みや腫れがおさまったときには、薬を飲み続けるかどうか、医師にご相談ください。
- 飲み始めて2～4週間たっても、あまり効果がないときには、医師にご相談ください。

## 主な副作用について

この薬を服用すると以下のような副作用が起こることがあります。

●腹痛、下痢 ●口内炎 ●発疹 ●傾眠

このような症状があらわれたり、その他気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。