

シロスタゾールOD錠「ケミファ」を 服用される患者さまへ

あなたがお飲みになるくすりは です



シロスタゾールOD錠
50mg「ケミファ」

チェック



シロスタゾールOD錠
100mg「ケミファ」

チェック



- 水なしでも服用できます。

■ 以下の方は使う前に必ず主治医に相談してください。

- 出血している(血友病、喀血、頭蓋内・消化管・尿路・硝子体の出血など)
- うつ血性心不全
- 妊婦または妊娠している可能性がある、授乳中
- 他にくすりなどを使っている(抗凝固剤、血栓溶解剤など)
- 心臓に病気がある
- 腎臓に障害がある
- 月経期間中
- 手術や抜歯を予定している
- アレルギー症状が出たことがある
- 肝臓に重い障害がある
- 糖尿病あるいは糖尿病の疑いがある
- 出血しやすい

ご自分の判断でシロスタゾールOD錠「ケミファ」の服用を止めたりすると、症状が悪化したり、再発することがあります。医師の指示を守って服用してください。

■ このくすりのはたらき

- 血管の中に血のかたまり(血栓)ができるのを防いだり、血管を拡げ、血液の流れを良くするはたらきがあります。
- 脳梗塞の再発を防ぐためや、足(下肢)の血液の流れが悪い時(慢性動脈閉塞症)の症状を和らげるために使われます。

■ 服用されるときに注意していただきたいこと

- 次のような場合には、シロスタゾールOD錠「ケミファ」を服用していることを医師または薬剤師に必ず伝えてください。

他の医療機関や歯科などで
別のおくすりの
処方を受ける場合

抜歯などの外科的処置や
内視鏡検査を
受ける場合など

- このおくすりを飲むことで、一時的に頭痛が起きたり動悸がすることがありますが、これは血管が拡がり血流が良くなつた為です。

※もしこれらの症状が続く場合は、すぐに医師または薬剤師
にご相談ください。

- このおくすりを飲んで、特に次のような症状があらわれたり、その他気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- | | |
|---------------------|----------------|
| ● がまんできないほどの頭痛 | ● 気分が悪い、吐き気がする |
| ● 意識がもうろうとする | ● 苦しいほど動悸がする |
| ● 熱が出たり、咳が出たりする | |
| ● 鼻血が出たり、あざができやすくなる | |

- グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。同時に飲むとおくすりの作用が強くなるおそれがあります。



日本ケミファ株式会社