

クロピドグレル錠「ケミファ」を 服用される患者さんへ



あなたがお飲みになるくすりは チェック です



クロピドグレル錠 25mg「ケミファ」



クロピドグレル錠 75mg「ケミファ」



このおくすりは、血栓(血のかたまり)ができて 血管がつまるのを防ぐおくすりです。

● 以下の方は使う前に必ず医師または薬剤師に相談してください。

- 出血している
- 出血しやすい
- アレルギー症状が出たことがある
- 妊婦または妊娠している可能性がある、授乳中
- 他にくすりなどを使っている
- 肝臓に重い障害がある
- 腎臓に重い障害がある
- 高血圧である
- 高齢である
- 体重が少ない
- 手術や抜歯を予定している

● ご自分の判断でこのおくすりの服用を止めたり、減らしたりすると、再発することがあります。医師または薬剤師の指示を守って服用してください。

服用されるときに注意していただきたいこと

- 次のような場合には、クロピドグレル錠「ケミファ」を服用していることを医師または薬剤師に必ず伝えてください。

他の医療機関や歯科などで
別のおくすりの
処方を受ける場合

抜歯などの外科的処置や
内視鏡検査を
受ける場合など

- 特に飲みはじめの2ヵ月間はまれに肝障害や血液障害などの副作用が起きることがあります。定期的に医師の診察を受け、血液検査など、医師の指示に従ってください。
- このおくすりを飲んで、特に次のような症状があらわれたり、その他気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚や白眼が黄色くなる
- うとうとする、意識が低下する
- 皮膚にあざができたり、ぶつぶつができる
- 鼻や歯ぐきからの出血がある
- 皮膚の広い範囲が赤色になる
- 尿が茶色っぽくなる
- 気分が悪い
- 強い疲労感、食欲低下がある
- かぜのような症状(熱が出る、さむけがする、のどが痛む)

- 1日1回服用してください。
- このおくすりを飲み忘れたら、気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分をお飲みください。※空腹時は避けることが望ましい。
決して2回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。

転院患者さん用

クロピドグレル錠「ケミファ」を 処方されている先生方へのお願い

クロピドグレル錠「ケミファ」を服用されている患者さんが転院される際には、本用紙に**クロピドグレル錠「ケミファ」の1日の服用量**(含量と錠数)等を必ず記載して、新しい医師にお見せいただくように患者さんにご指導ください。

クロピドグレル錠「ケミファ」を 服用される患者さんへ

診察を受ける病院・医院が変わったときは、
このカードをお見せください。

氏名

クロピドグレル錠「ケミファ」

(mg 錠 × 錠/日)

服用開始日： 年 月 日

病・医院名：

TEL： ()

このおくすりの服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、くすりの飲み方を守ってください。

このおくすりを飲んで、特に次のような症状があらわれたり、その他気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚や白眼が黄色くなる
- うとうとする、意識が低下する
- 皮膚にあざができたり、ぶつぶつができる
- 鼻や歯ぐきからの出血がある
- 皮膚の広い範囲が赤色になる
- 尿が茶色っぽくなる
- 気分が悪い
- 強い疲労感、食欲低下がある
- かぜのような症状(熱が出る、さむけがする、のどが痛む)

このおくすりは、血栓(血のかたまり)ができて血管がつまるのを防ぐおくすりです。

- 1日1回服用してください。
- このおくすりを飲み忘れたら、気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分をお飲みください。※空腹時は避けることが望ましい。決して2回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。

ご連絡先