

【生物学的同等性に関する資料】_デスロラタジン錠 5mg 「ケミファ」

● 目的

デスロラタジン錠 5mg 「ケミファ」と標準製剤の生物学的同等性を検討するため、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に従い試験を実施した。

● 使用製剤


試験製剤：デスロラタジン錠 5mg 「ケミファ」

標準製剤：デザレックス錠 5mg

● 試験方法

デスロラタジン錠 5mg 「ケミファ」とデザレックス錠 5mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (デスロラタジンとして 5mg) 健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中デスロラタジン濃度を測定した。

● 結果



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-72hr} (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
デスロラタジン錠 5mg 「ケミファ」	48.0227 ± 13.6573	3.2125 ± 1.0335	2.45 ± 1.07	19.20 ± 2.71
デザレックス錠 5mg	46.2884 ± 10.9968	3.1414 ± 0.9125	2.41 ± 1.14	19.28 ± 2.68

(平均値 ± 標準偏差, n=37)

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

● 結論

得られた薬物動態パラメータ (AUC、 C_{max}) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

出典：日本ケミファ株式会社 生物学的同等性に関する資料 (社内資料)