

ドネペジル塩酸塩錠・OD錠「ケミファ」を 服用される患者様へ

服用にあたっての注意

- 1日1回お飲みください(シートから取り出して服用してください)。
- お薬の量は主治医の指示に従ってください。
このお薬は3mg(黄色の錠剤)から開始し、1~2週間後に5mg(白色の錠剤)になります。その後、症状の進行に合わせて10mg(ピンク色の錠剤)になります。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に飲んではいけません。
- お薬を飲むことをあなたの判断で中止しないでください。

■ 主治医の指示をお守りください。

このお薬の主な副作用

- 服用を始めた頃やお薬の量が増えた頃に軽い吐き気、便が軟らかくなる、活発になりすぎる、イライラして落ち着かなくなるといったことがあるかもしれません。
いつもと違う状態が持続したり、激しい場合には医師や薬剤師に相談してください。

あなたがお飲みになる薬は  です。



ドネペジル塩酸塩錠
3mg「ケミファ」



錠剤(実物大)



ドネペジル塩酸塩錠
5mg「ケミファ」



錠剤(実物大)



ドネペジル塩酸塩錠
10mg「ケミファ」



錠剤(実物大)



ドネペジル塩酸塩
OD錠3mg「ケミファ」



錠剤(実物大)



ドネペジル塩酸塩
OD錠5mg「ケミファ」



錠剤(実物大)



ドネペジル塩酸塩
OD錠10mg「ケミファ」



錠剤(実物大)



- OD錠は、口の中ですばやく形が崩れるため、飲みやすい錠剤です。少量の水で飲み込むことができます。
- OD錠は飲む直前までシートから取り出さないでください。
- 直射日光などの強い光があたる場所で長時間保存しないでください。