

デュタステリド錠0.5mgAV「NS」を 服用される方へ

～服用カードつき～



このお薬は、前立腺肥大症の治療に使われます。
肥大した前立腺を少しずつ小さくするお薬ですので、主治医の指示を守って飲んでください。

1 割ったり、砕いたりしないでください。

このお薬は皮膚から吸収されますので、女性や子どもは砕いたり、破損したお薬に触れないでください。砕いたり、破損したお薬に妊婦が触れた場合、皮膚から吸収されて、男子胎児の生殖器官の発達に影響を及ぼすおそれがあります。砕いたり、破損したお薬に触れた場合は、すぐに石鹼と水で洗ってください。



2 女性や子どもの誤飲に注意してください。



3 お薬の飲み方

- * 1日1回1錠を包装から取り出して、水またはぬるま湯で飲んでください。
- * このお薬を嚙んだり、なめたりしないでください。□やのどの粘膜を刺激する場合があります。
- * 飲み忘れた場合は気がついたときに出来るだけ早く飲んでください。ただし、次の服用時間がせまっている場合は1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。決して1日に2回もしくは一度に2回分を飲まないでください。
- * 誤って多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- * 主治医の指示なしに、ご自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。

4 以下のような症状があらわれた場合には、主治医へ相談してください。

- * 肝機能障害、黄疸
(からだがかたくなる、皮膚や白目が黄色くなる、食欲がないなど)
- * 勃起不全
- * 性欲の減退
- * 乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)

など

5 前立腺がんの検査を受ける際は、このお薬を飲んで
いることを医師へ必ず伝えてください。

*このお薬は、前立腺がんの検査に用いられるPSA(血清前立腺特異抗原)値に影響を与えます。

*お薬の服用開始6ヵ月後より、PSA値を約50%減少させます*が、その影響を考慮することにより、このお薬を服用中でもPSA検査を行うことが可能です。

※デュタステリド錠0.5mgAV〔NS〕は前立腺がんの治療薬ではありません。

*PSA検査を受ける際は、このページの下にある『デュタステリド錠0.5mgAV〔NS〕服用カード』を、医師へ必ずご提示ください。

6 このお薬を服用中及び服用後6ヵ月間は献血を
しないでください。

7 AGA(男性型脱毛症)の飲み薬を医療機関から処
方されている方は、主治医または薬剤師へ必ず伝
えてください。

このカードは常に携帯してください。医療機関を受診される際や、健康診断などでPSA検査を受ける際は、医師へ必ずこのカードをご提示ください。

キリトリ線から簡単に切り
取ることができます。

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

デュタステリド錠0.5mgAV〔NS〕服用カード
このカードは常に携帯してください

患者さんへ
医療機関を受診される際や、健康診断などでPSA検査を受ける際は、医師へ必ずこのカードをご提示ください。

服用開始日

年 月 日

服用開始前のPSA値

ng/mL

お名前：

8 お薬の保管

- * 子どもの手の届かないところに保管してください。
- * 誤飲の原因となりますので、他の容器に入れ替えないでください。
- * お薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。廃棄方法については、処方された医療機関、薬局へ相談してください。
- * 他の人にこのお薬を渡すことは絶対にしないでください。

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師へ相談してください。

医療機関名・連絡先

このカードは常に携帯してください。医療機関を受診される際や、健康診断などでPSA検査を受ける際は、医師へ必ずこのカードをご提示ください。

キリトリ線

デュタステリド錠0.5mgAV[NS] 服用カード
このカードは常に携帯してください

患者さんよりこのカードを提示された
医師、健康診断のご担当の方へ

患者さんは前立腺肥大症治療薬のデュタステリド錠0.5mgAV[NS]を服用しています。

このお薬は、服用開始6ヵ月後より、PSA値を約50%減少させますので、患者さんのPSA値を評価される際は、このお薬の服用によるPSA値の減少にご注意いただきますようお願い申し上げます。

販売元：日本ケミファ株式会社 製造販売元：日新製薬株式会社

← キリトリ線から簡単に切り取ることが出来ます。

キリトリ線

販売元：日本ケミファ株式会社
製造販売元：日新製薬株式会社
2020年6月作成