

【フェブキソスタット OD 錠 40mg「ケミファ」】  
安定性に関する資料

日本ケミファ株式会社

● 目的

フェブキシソスタット OD 錠 40mg「ケミファ」の市場流通下における安定性を確認するため、加速試験を実施した。

● 保存条件

温度：40±2℃

湿度：75±5%RH

包装形態：PTP 包装（アルミピロー入り）

保存期間：6 ヶ月間

● 試験項目

性状、確認試験、純度試験（類縁物質）、製剤均一性（含量均一性試験）、崩壊性、溶出性、定量法、質量試験\*

\*規格の設定されていない試験項目

● 結果

PTP 包装

試験項目	規格	開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月
性状	白色～微黄色の割線入りの素錠	白色の割線入りの素錠			
確認試験	右の範囲に吸収の極大を示す 214～218nm 及び 314～318nm	適合			
純度試験 (類縁物質含有量※：%)	類縁物質 D-02：0.2%以下	0.02	0.02	0.02	0.02
	その他の最大類縁物質： 0.1%以下	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	類縁物質の合計：0.5%以下	0.02	0.02	0.02	0.02
製剤均一性 (判定値：%)	判定値が 15.0%以下	1.3～3.7	—	—	1.0～3.8
崩壊性 (崩壊時間：秒)	1 分以内に崩壊する	22～26	19～25	20～24	17～22
溶出性 (溶出率：%)	60 分間の溶出率が 75%以上	88.4～95.7	—	—	83.1～90.2
定量法 (含量：%)	95.0～105.0%	98.9～102.7	97.8～103.3	99.2～101.8	98.0～103.4
質量試験 (mg)	参考値	250.17～ 250.92	250.20～ 251.20	249.98～ 250.97	250.19～ 251.08

※標準溶液のフェブキシソスタットのピーク面積を 0.5%として算出。

表中の数値は、最小値～最大値を表す。 N.D.：検出しなかった —：実施せず

類縁物質 D-02：2-(3-Carbamoyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid

● 結論

フェブキシostat OD錠 40mg「ケミファ」は、通常の市場流通下において、3年間安定であることが推測された。

日本ケミファ株式会社：安定性に関する資料（社内資料）

2022年2月作成