

ラコサミド錠「ケミファ」 を服用される患者さんへ

あなたがお飲みになるお薬は です



ラコサミド錠50mg「ケミファ」

チェック



ラコサミド錠100mg「ケミファ」

チェック

表面 裏面

錠剤(原寸大)

ラコ
サミド
50
ケミファ

裏面

ラコ
サミド
50
ケミファ

ラコサミド錠50mg「ケミファ」

ラコサミド

50

Lacosamide Tablets
50mg "Chemiphar"

ラコサミド

50

ラコ
サミド
ケミファ

ラコサミド

50

(01)04987171373002

(01)04987171373002

表面 裏面

錠剤(原寸大)

ラコ
サミド
100
ケミファ

裏面

ラコ
サミド
100
ケミファ

ラコサミド錠100mg「ケミファ」

ラコサミド

100

Lacosamide Tablets
100mg "Chemiphar"

ラコサミド

100

ラコ
サミド
ケミファ

ラコサミド

100

(01)04987171373409

(01)0498717137409

服用にあたってのご注意

- 「めまい」「眠気」「頭痛」「吐き気・嘔吐」などがあこることがあります。
- 副作用があらわれてもご自身の判断で服用する量を減らしたり、服用するのをやめず、医師または薬剤師にご相談ください。
- めまい、霧視(霧がかかったような見え方)、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下があこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

ラコサミドの服用方法

- お薬に慣れるため、お薬の量を調整する期間とそのまま維持する期間があります。一定期間ごとに量を増やすなど調整し、症状がコントロールできる適切な量にします。
- お薬の量や服用タイミングは服用される方の状態によって医師が決定しますので、指示に従って服用してください。
- ご自身の判断で服用する量を増やしたり、減らしたりしないでください。

【____月____日から____月____日まで服用するラコサミドの量】

1回目 ()
50mg _____錠
100mg _____錠

2回目 ()
50mg _____錠
100mg _____錠

【____月____日から____月____日まで服用するラコサミドの量】

1回目 ()
50mg _____錠
100mg _____錠

2回目 ()
50mg _____錠
100mg _____錠

気になる症状がある場合や、分からぬことがある時などは、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先



日本ケミファ株式会社