


# ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」を 点眼される 患者さまへ


**1日1回、  
1滴だけ  
点眼してください**

1日に何度も点眼すると、  
効果が弱くなること  
があります。



## 点眼時の注意

- **コンタクトレンズをつけている場合**は、レンズを外して点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。(コンタクトレンズが変色することがあります。)
- **点眼の際**、手をよく洗い、容器の先が直接目に触れないように注意してください。
- **目のまわりに点眼液がついた場合**は、すぐにぬらしたティッシュやタオルでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。(目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が濃くなる場合があります。)
- **点眼後**は、しばらく目を閉じて、点眼液が鼻やのどの方に流れないように目がしらを軽く指で押さえてください。右図 ➡
- **他の点眼薬も使用する場合は**、5分間以上の間をあけて点眼してください。



## 点眼後は…

一時的に目がかすむことがあるため、症状が回復するまで自動車等の運転や、機械類の操作はしないでください。

## 何か異常を感じたら…

**次のような症状があらわれたときは、  
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。**

- 点眼により、黒目の色が徐々に濃くなる場合
- 点眼により、しみる、かゆい、痛い等の症状が続く場合
- その他、何か異常を感じた場合

## 取扱い上の注意

- 光を避けて、室温(1~30℃)で保存してください。
- 開封後、4週間以上経過した場合は、残液を使用しないでください。



(裏面もご覧ください)

施設名