

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」 を服用される患者さんへ

あなたがお飲みになるくすりは

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」です。

錠剤 (原寸大)



表面



裏面

PTPシート



こちらのおくすりは、患者さんのおくすり代の負担が
軽減されるジェネリック医薬品です

このおくすりはたらき

血液の流れを良くして、血液の循環が悪くなることによる
手足のしびれや痛み、冷感などの症状を和らげます。

以下の方は使う前に必ず医師または薬剤師に相談してください。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
- ・出血しやすい
- ・他におくすりなどを使っている

ご自分の判断でこのおくすりの服用を止めたり、減らしたりすると、症状が
悪化したり、再発することがあります。医師または薬剤師の指示を守って
服用してください。

服用されるときに注意していただきたいこと

- 次のような場合には、リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」を服用していることを医師または薬剤師に必ず伝えてください。

他の医療機関などで別のおくすりの処方を受ける場合

- 主な副作用として下痢、吐き気、嘔吐、顔のほてり、強い疲労感、食欲低下、皮膚や白眼が黄色くなることなどがあります。
- 上記のような症状があらわれたり、その他気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

・強い疲労感、食欲低下がある ・皮膚や白眼が黄色くなる



服用にあたって

- このおくすりを飲み忘れたら、気がついた時すぐに1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分をお飲みください。

決して2回分を一度に飲まないでください。

- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。
- 直射日光、高温、湿気を避けてPTP包装のまま保管してください。
- 飲み残したおくすりは、保管しないで廃棄してください。