

ロレアス® 配合錠「NS」を 服用される患者さんへ



- このお薬はクロピドグレル硫酸塩とアスピリンの2種類の有効成分を含んでいます。
- 血栓(血のかたまり)の形成を抑え、血管がつまるのを防ぎます。

このお薬を飲んで、普段と違う以下のような症状が
みられたら、すぐに医師または薬剤師に連絡し、
指示に従ってください。

- 皮膚が黄色くなる
- 皮膚にあざができたり、ぶつぶつができる
- 気分が悪い
- 息苦しい
- 胸がドキドキする
- 強い疲労感、食欲低下がある
- うとうとする、意識が低下する
- 白眼が黄色くなる
- 鼻や歯ぐきからの出血がある
- 尿が茶色っぽくなる
- かぜのような症状が出る(熱が出る、さむけがする、のどが痛む)

次のような方は使う前に必ず医師または 薬剤師に相談してください。

- 以前にお薬を使用して、喘息、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
- 出血している
- みぞおちの痛みや圧痛がある
- 胸やけ、げっぷ、吐き気、嘔吐、吐血、下血がある
- 抜歯や手術を予定している
- 現在、妊娠中または授乳中
- 現在、他のお薬を飲んでいる

**診察を受ける病院・医院が変わったときは、
このお薬を飲んでいることをお伝えください。**

服用にあたってのご注意

- 1日1回服用してください。
※空腹時は避けることが望ましい。
- 飲み忘れた分と合わせて2錠を一度に服用しないでください。
- アルコール(飲酒)はこのお薬に影響しますので、控えてください。
- 割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、そのまま噛まずに飲んでください。
- ご自分の判断で服用を中止したり量を加減しないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 直射日光、湿気を避け、また、他の方が誤って飲んでしまうことがないように、注意して保管してください。
- 飲み残した場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- その他にも、気になることがございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。