

# ナフトピジルOD錠「ケミファ」を 服用される患者さんへ



あなたがお飲みになるくすりは  **です**



チェック

ナフトピジルOD錠  
25mg「ケミファ」



チェック

ナフトピジルOD錠  
50mg「ケミファ」



チェック

ナフトピジルOD錠  
75mg「ケミファ」

錠剤 (実物大)

表面

裏面



錠剤 (実物大)

表面

裏面



錠剤 (実物大)

表面

裏面



このおくすりは **前立腺肥大症に伴う排尿障害** を治療するおくすりです。

白内障などの眼科手術を受ける際の注意

このおくすりを服用していることを、眼科の先生にお伝えください。

## 服用されるときに注意していただきたいこと

- めまい、立ちくらみなどがあらわれることがありますので、高い所での作業、自動車の運転など危険を伴う作業は十分注意してください。
- このおくすりは水なしでも服用できます。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして唾液と一緒に飲み込んでください。水で服用することもできます。ただし、寝たままの状態では、水なしで服用しないでください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時に早めに飲んでください。ただし、次の服薬予定時刻が近い場合は1回とばして、次の服薬予定時刻に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。

## おくすりの副作用について

主な副作用として、めまい・ふらつき、立ちくらみ、低血圧（起立性低血圧を含む）、胃部不快感、発疹、かゆみ、蕁麻疹などが報告されています。

このような症状があわられたり、その他気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先