

ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μ g「ケミファ」 を服用される患者さんへ

あなたがお飲みになる薬は
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μ g「ケミファ」です。

錠剤(原寸大)



PTPシート



- カプセルは、服用する直前にシートから取り出してお飲みください。

この薬は透析または肝疾患治療を
受けている方のかゆみを改善する薬です。

- 次のような方は、使う前に必ず医師または薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
- 妊婦または妊娠している可能性がある、または授乳中である
- ほかに薬を使用している(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)

- この薬は、体調がよくなったと自己判断して薬の服用を止めたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。医師または薬剤師の指示を守って服用してください。

服用されるときに注意していただきたいこと

- 次のような症状に気づいたら、必ず医師または薬剤師に相談してください。

- なかなか寝付けない
- 便秘になる
- おしっこが近くなる*
- 眠気がする
- めまいがする

※おしっこが近くなる症状は肝疾患治療を受けている方に気を付けてほしい症状です。

これらの症状は、飲み始めてから、血液透析を受けている方は2週間以内、肝疾患治療を受けている方は4週間以内にあらわれることが多いので特に気をつけてください。

また、この薬を長い間飲み続けた場合にも、体調の変化によって、これらの症状があらわれることがあります。

- 眠気、めまいなどがあらわれることがありますので、車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- グレープフルーツジュースはこの薬の血漿中濃度を高め、作用を強めることがありますので、一緒に摂らないようにしてください。

服用にあたって

- 夕食後の服用を指示されている場合、飲み忘れに気が付いたのがその日の就寝前ならば、1回分を飲んでください。
それ以外の場合は、飲み忘れた分は1回分とばして、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 気温の高い場所や光が直接当たる場所での保管は避けてください。
- 小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。