

服用にあたってのご注意

- 次のような場合にはリバーロキサバンOD錠「TCK」を服用していることを医師または薬剤師に必ず伝えてください。

他の医療機関を受診する
場合や薬局などで別の
おくすりを購入する場合

抜歯などの外科的処置や
内視鏡検査などを
受ける場合

- **ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。**
服用し忘れると血栓塞栓症が起こる危険性が高まります。
- これまで服用していた他の抗凝固薬が残っている場合は、必ず医師または薬剤師にお伝えください。決して、リバーロキサバンOD錠「TCK」と残っている抗凝固薬を合わせて服用しないでください。
- このおくすりは、水なしでも服用できます。ただし寝たままの状態では、水なしで服用しないでください。

気になる症状がある場合、分からないことがある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先

リバーロキサバンOD錠「TCK」 (抗凝固薬)を服用しています

リバーロキサバンOD錠「TCK」を服用している患者さんへ

- 本カードは、リバーロキサバンOD錠「TCK」を服用中は、常に携帯してください。
- 他の医院・診療科・歯科医院等を受診される際は、必ずご提示ください。
- リバーロキサバンOD錠「TCK」を服用する際は、主治医の指示に必ず従ってください。また、出血などの副作用が気になる場合は、ご自身の判断で服用を中止せず、主治医にすぐに、ご連絡ください。

