

イグラチモド錠25mg「ケミファ」を 服用される患者さんへ

あなたがお飲みになるお薬は
イグラチモド錠25mg「ケミファ」です。

錠剤(原寸大)



PTP シート



このお薬は、免疫機能や炎症に関与している細胞の働きを
抑えることにより、関節リウマチに伴う関節の腫れや
痛みの症状を改善するお薬です。

服用にあたって

- ワルファリンを服用中の方は、このお薬を服用できません。
ご自分の判断で服用を中止したりせずに、すぐに医師または薬剤師に相談し、その指示に従ってください。
- 以下の方は服用を始める前に必ず医師または薬剤師に相談してください。
 - ☐ 肝臓の病気にかかったことがある人
 - ☐ 消化性潰瘍(胃潰瘍、十二指腸潰瘍)と診断されたことがある人
 - ☐ 現在、消化器の異常(腹痛、便が黒くなる、吐き気、胸やけなど)がある人
 - ☐ 体重 40kg 未満の人
 - ☐ 貧血や血液の検査での異常を指摘されたことがある人
 - ☐ 腎臓の病気にかかったことがある人
 - ☐ 以前に薬を飲んでかゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことがある人
 - ☐ 現在、リウマチ以外の病気で治療を受けている人
 - ☐ 現在、妊婦または妊娠している可能性がある人
 - ☐ 授乳中の人

服用のしかた

- このお薬は、1日1回(朝食後に1錠)から開始し、4週間以上服用した後、医師の指示に従って、1日2回(朝食後と夕食後に1錠ずつ)に増やします。

このような服用方法にすることで、副作用の発現する頻度が低くなることがわかっています。

服用中のお願い

- 他の医療機関を受診するときは、『イグラチモド錠25mg「ケミファ」を服用される方へ』(ワルファリンカリウム併用禁忌注意喚起用)を医師または薬剤師に見せてください。
- このお薬の効果があらわれるまで、数か月かかることもあります。ご自分の判断でお薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- 医師の指示に従って、定期的に血液の検査や尿の検査を受けてください。
定期的に検査を受けることによって、副作用を早めに発見し、適切な処置を行うことができます。
- お薬を服用し忘れた場合は、服用し忘れた分をとばして、次の服用時間に1回分(1錠)を服用してください。2回分(2錠)を一度に服用しないでください。

**このお薬を飲んで、以下のような症状が
現れた場合には、医師や薬剤師にご相談ください。**

- 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる
- のどの痛み、息切れ、鼻血・歯ぐきの出血
- 吐き気、腹痛、下血
- から咳、発熱、呼吸困難
- 発熱、寒気、関節の痛み

その他にも、気になることがございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。



日本ケミファ株式会社

抗リウマチ剤

イブラチモド錠25mg「ケミファ」を 服用される方へ

ワルファリン製剤を飲まれている方は本剤を服用できません。他の医療機関を受診されるときは、このカードを医師・薬剤師にお見せください。



日本ケミファ株式会社

医療機関の方へのお願い

患者さんは関節リウマチ治療のためにイグラチモド錠25mg「ケミファ」を服用しています。禁忌であるワルファリン製剤は併用できませんので、ワルファリン製剤による治療が必要な場合、下記に記載の医療機関にご連絡ください。

施設連絡先