

＊ 2025年9月改訂（第3版）  
＊ 2024年8月改訂（第2版）

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

日本標準商品分類番号
872149 (2mg, 4mg, 8mg, 12mg)
872179 (2mg, 4mg, 8mg)

	2mg	4mg	8mg	12mg
承認番号	22600AMX00995000	22600AMX00996000	22600AMX00997000	22600AMX00998000
販売開始	2014年12月	2014年12月	2014年12月	2014年12月

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤  
処方箋医薬品<sup>注)</sup>

日本薬局方 **カンデサルタン シレキセチル錠**

**カンデサルタン錠2mg「ケミファ」**

**カンデサルタン錠4mg「ケミファ」**

**カンデサルタン錠8mg「ケミファ」**

**カンデサルタン錠12mg「ケミファ」**

**Candesartan Tablets 2mg・4mg・8mg・12mg “Chemiphar”**

注)注意-医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者  
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]  
2.3 アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）[10.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	カンデサルタン錠12mg「ケミファ」
有効成分 (1錠中)	(日局) カンデサルタン シレキセチル 2.0mg 4.0mg 8.0mg 12.0mg			
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、黄色5号			

3.2 製剤の性状

販売名	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	カンデサルタン錠12mg「ケミファ」
性状	白色～帯黄白色の素錠	白色～帯黄白色の割線入りの素錠	ごくうすいだいだい色の割線入りの素錠	うすいだいだい色の割線入りの素錠
外形	表			
	裏			
	側面			
直径	7.0mm	7.1mm	7.1mm	7.1mm
厚さ	2.6mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm
重量	130mg	130mg	130mg	130mg
識別コード	カンデサルタン 2 ケミファ	カンデサルタン 4 ケミファ	カンデサルタン 8 ケミファ	カンデサルタン 12 ケミファ

4. 効能又は効果

＜カンデサルタン錠2mg・4mg・8mg・12mg「ケミファ」＞

- 高血圧症  
○腎実質性高血圧症

＜カンデサルタン錠2mg・4mg・8mg「ケミファ」＞

下記の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合  
○慢性心不全（軽症～中等症）

5. 効能又は効果に関連する注意  
（慢性心不全）

- 5.1 アンジオテンシン変換酵素阻害剤投与による前治療が行われていない患者における本剤の有効性は確認されておらず、本剤は、アンジオテンシン変換酵素阻害剤から切り替えて投与することを原則とする。  
5.2 アンジオテンシン変換酵素阻害剤の効果が不十分な患者における本剤の有効性及び安全性、並びにアンジオテンシン変換酵素阻害剤と本剤を併用した場合の有効性及び安全性は確認されていない。  
5.3 NYHA 心機能分類Ⅳの慢性心不全患者に対する本剤の有効性は確立していない（使用経験が少ない）。

6. 用法及び用量

（高血圧症）

成人

通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

小児

通常、1歳以上6歳未満の小児には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして0.05～0.3mg/kgを経口投与する。通常、6歳以上の小児には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

（腎実質性高血圧症）

通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

（慢性心不全）

通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量できる。なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。

7. 用法及び用量に関連する注意

（高血圧症）

小児に投与する場合には、成人の用量を超えないこと。

（慢性心不全）

投与開始時の収縮期血圧が120mmHg未満の患者、腎障害を伴う患者、利尿剤を併用している患者、心不全の重症度の高い患者には、2mg/日から投与を開始すること。2mg/日投与は、低血圧関連の副作用に対する忍容性を確認する目的であるので4週間を超えて行わないこと。

本剤の投与により、一過性の急激な血圧低下を起こす場合があるので、初回投与時、及び4mg/日、8mg/日への増量時には、血圧等の観察を十分に行うこと。[9.1.3、9.1.4、9.1.7、9.1.8、9.2.1、9.2.2、10.2 参照]

## 8. 重要な基本的注意

### 〈効能共通〉

- 8.1 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 8.2 手術前24時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン-アンジオテンシン系の抑制作用による高度な血圧低下を起こす可能性がある。

### 〈慢性心不全〉

- 8.3 通常、ジギタリス製剤、利尿剤等と併用する。なお、本剤の単独投与での有用性は確立していない。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。

#### 9.1.2 高カリウム血症の患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。高カリウム血症を増悪させるおそれがある。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、血清カリウム値に注意すること。

#### 9.1.3 嚴重な減塩療法中の患者

##### 〈高血圧症〉

少量より開始し、増量する場合は血圧、腎機能及び患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。まれに血圧が急激に低下し、ショック、失神、一過性の意識消失や腎機能の低下を起こすおそれがある。[11.1.2 参照]

##### 〈慢性心不全〉

血圧、腎機能、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがある。[7.、11.1.2 参照]

#### 9.1.4 低ナトリウム血症の患者

##### 〈高血圧症〉

少量から開始し、増量する場合は血圧、腎機能及び患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。まれに血圧が急激に低下し、ショック、失神、一過性の意識消失や腎機能の低下を起こすおそれがある。[11.1.2 参照]

##### 〈慢性心不全〉

血圧、腎機能、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがある。[7.、11.1.2 参照]

#### 9.1.5 心不全の患者

##### 〈高血圧症〉

少量より開始し、増量する場合は血圧、腎機能及び患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。まれに血圧が急激に低下し、ショック、失神、一過性の意識消失や腎機能の低下を起こすおそれがある。[11.1.2 参照]

#### 9.1.6 大動脈弁狭窄症又は閉塞性肥大型心筋症のある患者

##### 〈慢性心不全〉

過度の血圧低下を来すと、症状が悪化するおそれがある。[11.1.2 参照]

#### 9.1.7 低血圧の患者

##### 〈慢性心不全〉

血圧、腎機能、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがある。[7.、11.1.2 参照]

#### 9.1.8 NYHA 心機能分類Ⅲ等の比較的重症度の高い慢性心不全患者

##### 〈慢性心不全〉

血圧、腎機能、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがある。[7.、11.1.2 参照]

#### 9.1.9 薬剤過敏症の既往歴のある患者

### 9.2 腎機能障害患者

#### 9.2.1 腎障害のある患者

##### 〈高血圧症〉

少量より開始し、増量する場合は血圧、腎機能及び患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。まれに血圧が急激に低下し、ショック、失神、一過性の意識消失や腎機能の低下を起こすおそれがある。[9.7.3、11.1.2 参照]

##### 〈慢性心不全〉

血圧、腎機能、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがある。

慢性心不全の臨床試験において、腎障害の合併が腎機能低下発現の要因であった。[7.、11.1.2 参照]

#### 9.2.2 血液透析中の患者

##### 〈高血圧症〉

少量より開始し、増量する場合は血圧及び患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。まれに血圧が急激に低下し、ショック、失神、一過性の意識消失を起こすおそれがある。[11.1.2 参照]

##### 〈慢性心不全〉

血圧、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。急激な血圧低下あるいは貧血を起こすおそれがある。[7.、11.1.2 参照]

### 9.3 肝機能障害患者

少量から投与を開始するなど慎重に投与すること。肝機能が悪化するおそれがある。また、活性代謝物カンデサルタンのクリアランスが低下することが推定されている。[16.1.2 参照]

### 9.4 生殖能を有する者

#### 9.4.1 妊娠する可能性のある女性

妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている<sup>1),2)</sup>。本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]

- (1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
- (2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。
  - ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
  - ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
  - ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。妊娠中期及び末期にアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤又はアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。[2.2、9.4.1 参照]

### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ラットの周産期及び授乳期に本剤を強制経口投与すると、10mg/kg/日以上で群で出生児に水腎症の発生増加が認められている<sup>3)</sup>。なお、ラットの妊娠末期のみ、あるいは授乳期にのみ本剤を投与した場合、いずれも300mg/kg/日で出生児に水腎症の増加が認められている。

### 9.7 小児等

9.7.1 低出生体重児、新生児又は乳児（1歳未満）を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.7.2 糸球体ろ過量（GFR）が30mL/min/1.73m<sup>2</sup>未満の小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.7.3 腎機能及び血清カリウム値を注意深く観察すること。小児等の高血圧では腎機能異常を伴うことが多い。特に、腎機能に影響を及ぼす状態（発熱、脱水）の患者に本剤を投与する場合や血清カリウム値を上昇させる可能性がある他の薬剤と併用する場合は注意すること。[9.2.1、10.2 参照]

### 9.8 高齢者

一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

10. 相互作用

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレンフマル酸塩 ラジレス （糖尿病患者に使用する 場合。ただし、 他の降圧治療を行っ てもなお血圧のコン トロールが著しく不 良の患者を除く。） [2.3 参照]	非致死性脳卒中、腎機 能障害、高カリウム血 症及び低血圧のリスク 増加が報告されている。	レニン-アンジオテン シン系阻害作用が増強 される可能性がある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン トリウムテレン等 エブレネン カリウム補給剤 [9.7.3 参照]	血清カリウム値が上昇 することがある。	本剤のアルドステロン 分泌抑制作用によりカ リウム貯留作用が増強 することによる。 危険因子：特に腎機能 障害のある患者
利尿剤 フロセミド トリクロルメチアジ ド等 [11.1.2 参照]	利尿剤で治療を受けて いる患者に本剤を初め て投与する場合、降圧 作用が増強するおそれ があるので、少量から 開始するなど慎重に投 与すること。	利尿剤で治療を受けて いる患者にはレニン活 性が亢進している患者 が多く、本剤が奏効し やすい。 危険因子：特に最近利 尿剤投与を開始した患 者
アリスキレンフマル酸塩 [9.7.3 参照]	腎機能障害、高カリ ウム血症及び低血圧 を起こすおそれがある。 eGFRが60mL/ min/1.73m <sup>2</sup> 未満の腎 機能障害のある患者へ のアリスキレンフマル 酸塩との併用について は、治療上やむを得な いと判断される場合を 除き避けること。	レニン-アンジオテン シン系阻害作用が増強 される可能性がある。
アンジオテンシン変換 酵素阻害剤 [9.7.3 参照]	腎機能障害、高カリ ウム血症及び低血圧を起 こすおそれがある。	
リチウム	リチウム中毒が報告さ れている。	腎尿細管におけるリチ ウムの再吸収が促進さ れる。
次の薬剤により併用治 療されている場合 (1) アンジオテンシ ン変換酵素阻害剤及 びβ遮断剤 (2) ループ利尿剤及 びカリウム保持性利 尿剤 [7.、11.1.2 参照]	慢性心不全の臨床試験 では、左記の併用に加 え更に本剤を併用する と、立ちくらみ、ふら つき及び低血圧の発現 頻度が高く、かつ程度 が高い。 腎機能低下あるいは貧 血を起こすおそれがある。	(1) レニン-アンジオテ ンシン系阻害作用が増 強される可能性がある。 (2) 利尿剤で治療を受 けている患者にはレニ ン活性が亢進している 患者が多く、本剤が奏 効しやすい。 危険因子：嚴重な減塩 療法中の患者、低ナトリ ウム血症の患者、低血 圧の患者、NYHA心機 能分類Ⅲ等の比較的重 症度の高い慢性心不全 患者、腎障害のある患 者、血液透析中の患者
非ステロイド性消炎鎮 痛剤（NSAIDs） インドメタシン等	降圧作用が減弱するこ とがある。  腎障害のある患者で は、さらに腎機能が悪 化するおそれがある。	非ステロイド性消炎鎮 痛剤は血管拡張作用を 有するプロスタグラン ジンの合成を阻害する ことから、降圧作用を 減弱させる可能性があ ると考えられている。  非ステロイド性消炎鎮 痛剤のプロスタグラン ジン合成阻害作用によ り、腎血流量が低下す るためと考えられてい る。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

\* \* 11.1.1 血管性浮腫（頻度不明）

顔面、口唇、舌、咽・喉頭等の腫脹を症状とする血管性浮腫があらわれることがある。また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管血管性浮腫があらわれることがある。

11.1.2 ショック（頻度不明）、失神、意識消失（頻度不明。ただし慢性心不全の場合0.1～5%未満）  
冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[9.1.3-9.1.8、9.2.1、9.2.2、10.2 参照]

11.1.3 急性腎障害（頻度不明。ただし慢性心不全の場合は0.1～5%未満）

11.1.4 高カリウム血症（頻度不明）

11.1.5 肝機能障害、黄疸（頻度不明）

AST、ALT、γ-GTPの上昇等の肝機能障害があらわれることがある。

11.1.6 無顆粒球症（頻度不明）

11.1.7 横紋筋融解症（頻度不明）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.8 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.9 低血糖（頻度不明）

脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止すること。糖尿病治療中の患者であられやすい。

11.2 その他の副作用

〈高血圧症〉

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症	発疹、湿疹、蕁麻疹、そう痒、光線過敏症		
循環器	めまい、ふらつき、立ちくらみ、動悸、ほてり	期外収縮、心房細動	
精神神経系	頭痛、頭重感、不眠、眠気、舌のしびれ感	四肢のしびれ感	
消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、心窩部痛、下痢、口内炎	味覚異常	
肝臓	AST、ALT、Al-P、LDH、γ-GTPの上昇		
血液	貧血、白血球減少、白血球増多、好酸球増多、血小板減少		
腎臓	BUN、クレアチニンの上昇、蛋白尿		
* その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴、関節痛

〈慢性心不全〉

慢性心不全例では高血圧例に比べ立ちくらみ、ふらつき、低血圧、腎機能異常及び貧血等があらわれやすく、血圧、腎機能及び貧血の指標（ヘモグロビン等）に留意すること。なお、高血圧症の場合の副作用にも注意が必要である。

	5%以上	0.1～5%未満	頻度不明
過敏症		発疹、そう痒	
循環器	立ちくらみ、低血圧、ふらつき	めまい、徐脈、動悸、期外収縮、ほてり	
精神神経系		頭痛、眠気、不眠、頭重感、しびれ感	
消化器		悪心、心窩部痛、便秘、胃潰瘍、口渇、味覚異常、嘔吐、食欲不振、胃部不快感	
肝臓	γ-GTP上昇	ALT、AST、LDH、Al-Pの上昇	
血液	貧血	白血球減少、好酸球増多、白血球増多、血小板減少	
腎臓	BUN、クレアチニンの上昇	蛋白尿	
* その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	関節痛

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部


が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 反復投与

本態性高血圧症患者8例（38～68歳）に、1日1回4mgを朝食後に初回投与し、さらに1日休薬後連日7日間反復投与した時、いずれも血中には活性代謝物のカンデサルタン及び非活性代謝物M-IIが検出されるが、未変化体はほとんど検出されない。1日目（初回投与後）及び9日目（7日間反復投与後）のカンデサルタンの血中濃度は投与4～6時間後にピークに達した後、徐々に低下する<sup>4)</sup>。



測定物質	投与日	Cmax (ng/mL)	Tmax (h)	AUC <sub>0-30h</sub> (ng・h/mL)	T <sub>1/2α</sub> (h)	T <sub>1/2β</sub> (h)
カンデサルタン	1日目	55.1±19.9	5.0±1.1	428±91 <sup>b)</sup>	2.2±1.4	9.5±5.1
	9日目	55.7±14.1	4.5±1.3	509±151	2.0±0.7	11.2±7.2
M-II	1日目	8.3±2.7	8.0±1.9	136±48 <sup>b)</sup>	—	8.9±2.6 <sup>a)</sup>
	9日目	10.9±3.4	6.8±1.5	197±64	—	13.7±6.1 <sup>a)</sup>

(平均値±標準偏差、n=8)

a) コンパートメントモデルにより推定した。

b) n=7

16.1.2 血中カンデサルタン濃度測定値を用いたPopulation Pharmacokinetics (PPK) 解析

健康成人男子延べ168例、本態性高血圧症及び高齢本態性高血圧症患者延べ30例、腎障害を伴う高血圧症患者18例、肝障害を伴う高血圧症患者8例、計224例から得られた2,886時点の血中カンデサルタン濃度測定値を用いて、性、年齢、体重、肝機能指標（AST、ALT）、腎機能指標（血清クレアチニン、BUN）、血中アルブミン値及び高血圧の有無とカンデサルタンのクリアランス、分布容積、相対的バイオアベイラビリティとの関連性を検討した結果、肝障害患者（AST値>40又はALT値>35）におけるクリアランスが45%低下することが推定されている<sup>5)</sup>。[9.3 参照]


16.1.3 生物学的同源性試験

〈カンデサルタン錠4mg「ケミファ」〉

カンデサルタン錠4mg「ケミファ」とプロプレス錠4を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（カンデサルタン シレキセチルとして4mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中カンデサルタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log（0.80）～log（1.25）の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>6)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-30h</sub> (ng・h/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (h)	T <sub>1/2</sub> (h)
カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	501.0±93.9	44.36±11.12	5.1±1.7	7.51±1.04
プロプレス錠4	456.9±94.4	39.93±11.17	5.2±1.4	8.74±3.20

(平均値±標準偏差、n=29)




〈カンデサルタン錠8mg「ケミファ」〉

カンデサルタン錠8mg「ケミファ」とプロプレス錠8を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（カンデサルタン シレキセチルとして8mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中カンデサルタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log（0.80）～log（1.25）の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>6)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-30h</sub> (ng・h/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (h)	T <sub>1/2</sub> (h)
カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	969.1±288.7	81.16±26.12	4.8±1.2	7.71±1.95
プロプレス錠8	881.8±218.4	71.58±21.87	5.6±1.8	8.73±2.83

(平均値±標準偏差、n=20)




〈カンデサルタン錠12mg「ケミファ」〉

カンデサルタン錠12mg「ケミファ」とプロプレス錠12を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（カンデサルタン シレキセチルとして12mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中カンデサルタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log（0.80）～log（1.25）の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>6)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-30h</sub> (ng・h/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (h)	T <sub>1/2</sub> (h)
カンデサルタン錠12mg「ケミファ」	1,395.82±368.15	124.341±45.227	4.6±1.2	8.01±2.58
プロプレス錠12	1,284.47±337.91	112.529±38.393	5.0±1.3	7.89±2.25

(平均値±標準偏差、n=30)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.3 分布

[<sup>14</sup>C]カンデサルタンをヒトの血清、4%ヒト血清アルブミン溶液に添加した時の蛋白結合率は、ともに99%以上である<sup>7)</sup>（*in vitro*）。

16.4 代謝

カンデサルタン シレキセチルはカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物カンデサルタンに代謝され、さらに一部がCYP2C9により非活性代謝物M-IIに代謝されるが、本態性高血圧症患者にカンデサルタン シレキセチルを投与したときのM-IIの血中濃度及び尿中排泄率は

カンデサルタンの血中濃度及び尿中排泄率に比べ低く、CYP2C9の遺伝的多型によるカンデサルタンの血中濃度への影響は少ないと考えられる<sup>5)</sup>。  
また、カンデサルタンはCYP1A1、1A2、2A6、2B6、2C8、2C9、2C19、2D6、2E1、3A4の代謝活性を阻害しない<sup>8)</sup> (*in vitro*)。

16.5 排泄  
本態性高血圧症患者（38～68歳）8例、高齢本態性高血圧症患者（65～70歳）6例、腎障害を伴う高血圧症患者18例、肝障害を伴う高血圧症患者8例に1日1回4mgを朝食後に初回投与し、さらに1日休薬後連日7日間反復投与した時、いずれも尿中には未変化体は検出されず、活性代謝物のカンデサルタン及び非活性代謝物M-IIが排泄される。投与24時間までの尿中カンデサルタン及びM-IIの総排泄率は本態性高血圧症患者で11～12%、高齢本態性高血圧症患者では10～12%、肝障害を伴う高血圧症患者で約10～11%であり、ほとんど差は認めない。腎障害を伴う高血圧症の尿中排泄率は、血清クレアチニン3.0mg/dL以上の患者では1日目1.1%、9日目1.8%で、血清クレアチニン1.5mg/dL未満の腎機能正常例では1日目6.8%、9日目9.3%であった。  
以上の反復投与時の血中濃度、尿中排泄率からみて、本態性高血圧症患者、高齢本態性高血圧症患者、肝障害を伴う高血圧症患者及び腎障害を伴う高血圧症患者ともに蓄積性は認められないと考えられる<sup>4), 9)-11)</sup>。

16.6 特定の背景を有する患者  
16.6.1 腎障害患者  
腎障害（血清クレアチニン：0.6～3.6mg/dL）を伴う高血圧症患者18例に1日1回4mgを朝食後に初回投与し、さらに1日休薬後連日7日間反復投与した場合、血中濃度は本態性高血圧症患者の場合とほとんど差は認められない<sup>10)</sup>。  
16.6.2 肝障害患者  
肝障害（ICG<sub>R15</sub>：15.0～28.0%）を伴う高血圧症患者8例に1日1回4mgを朝食後に初回投与し、さらに1日休薬後連日7日間反復投与した場合、血中濃度は本態性高血圧症患者の場合とほとんど差は認められない<sup>11)</sup>。

16.6.3 高齢者  
高齢本態性高血圧症患者（65～70歳）6例に1日1回4mgを朝食後に初回投与し、さらに1日休薬後連日7日間反復投与した場合、血中濃度は本態性高血圧症患者の場合とほとんど差は認められない<sup>9)</sup>。

16.7 薬物相互作用  
メチルジゴキシン使用中の慢性心不全患者（54～74歳）5例にカンデサルタン シレキセチル錠1日1回4mgを朝食後に初回投与し、さらに1日休薬後連日7日間反復投与した時においても、血中ジゴキシン濃度はカンデサルタン シレキセチル錠非投与時に比較して増加は認められない。また、カンデサルタンの血中濃度は本態性高血圧症患者にカンデサルタン シレキセチル錠を単独投与した場合とほとんど差は認められない<sup>12), 13)</sup>。

16.8 その他  
カンデサルタン錠2mg「ケミファ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、カンデサルタン錠4mg「ケミファ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判断され、生物学的に同等とみなされた<sup>6)</sup>。

17. 臨床成績  
17.1 有効性及び安全性に関する試験  
<高血圧症>  
17.1.1 国内臨床試験  
高血圧症、腎実質性高血圧症の各患者を対象に、1日1回2～12mgを一般臨床試験では8～24週間、二重盲検比較試験では12週間、長期投与試験では24～52週間、腎障害を伴う高血圧症及び重症高血圧症における試験では2～8週間、経口投与した臨床試験において、降圧効果が評価された高血圧症のタイプ別有効率は次表のとおりである<sup>14)-27)</sup>。

高血圧症のタイプ	有効率（「下降」*の率）	
	「判定不能」を含む	「判定不能」を除く
本態性高血圧症（軽・中等症）	72.6% (606/835)	78.1% (606/776)
重症高血圧症	77.5% (31/40)	83.8% (31/37)
腎障害を伴う高血圧症	63.4% (26/41)	72.2% (26/36)
腎実質性高血圧症	66.7% (22/33)	73.3% (22/30)
合計	72.4% (663/916)	78.1% (663/849)

\*収縮期血圧（≥20mmHg以上）及び拡張期血圧（≥10mmHg以上）を満たす場合、平均血圧（≥13mmHg以上）を満たす場合、あるいは、下降傾向であっても、150/90mmHg未満（ただし、腎障害を伴う高血圧症の入院患者では、140/85mmHg未満）に降圧した場合

なお、本態性高血圧症患者を対象とした二重盲検比較試験の結果、カンデサルタン シレキセチル錠の有用性が認められている。

<慢性心不全>  
17.1.2 国内第Ⅲ相試験  
慢性心不全の患者を対象に、カンデサルタン シレキセチル錠1日1回4mgを2～4週間投与し、その後1日1回8mgを24週間投与した二重盲検比較試験（プラセボ対照）の結果、アンジオテンシン変換酵素阻害剤で治療されているか、あるいは治療されたことがある患者に対しアンジオテンシン変換酵素阻害剤に替えてカンデサルタン シレキセチル錠又はプラセボを投与した場合の「心不全症状の明らかな悪化」\*の発現はカンデサルタン シレキセチル錠投与群4.6% (3/65例) であり、プラセボ群30.3% (23/76例) に比べ有意に抑制され、カンデサルタン シレキセチル錠の有用性が認められている。なお、上記試験では、ジギタリス製剤（52%）、利尿剤（83%）等が併用されている。  
※心不全症状の悪化により入院・加療を要する場合、あるいは、心不全治療剤（強心剤、利尿剤、不整脈用剤、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外の血管拡張剤）の追加・増量処置を行い、約2週間後以降も同様の処置を継続する場合など主治医が悪化と判断した場合  
カンデサルタン シレキセチル錠投与群において58.9%、プラセボ投与群において51.0%に臨床検査値の異常を含む副作用がみられた。また、心不全の悪化に伴わない心血管系のイベントがカンデサルタン シレキセチル錠群に4例（心室細動、意識喪失、一過性意識障害、脳梗塞）、プラセボ群に2例（再狭窄部へのPTCA施行、脳梗塞）、重篤な副作用がカンデサルタン シレキセチル錠群で2例（急性腎障害、胃潰瘍）、プラセボ群で1例（十二指腸潰瘍）みられた。このうちカンデサルタン シレキセチル錠群でみられた心室細動、脳梗塞の転帰として死亡が確認された<sup>28), 29)</sup>。

18. 薬効薬理  
18.1 作用機序  
カンデサルタン シレキセチルの降圧作用は、生体内で吸収過程において速やかに加水分解され活性代謝物カンデサルタンとなり、主に血管平滑筋のアンジオテンシンⅡタイプ1（AT<sub>1</sub>）受容体においてアンジオテンシンⅡと拮抗し、その強力な血管収縮作用を抑制することによって生ずる末梢血管抵抗の低下による。さらに、AT<sub>1</sub>受容体を介した副腎でのアルドステロン遊離に対する抑制作用も降圧作用に一部関与していると考えられる<sup>30)-33)</sup> (*in vitro*, *in vivo* (ラット))。  
18.2 レニン-アンジオテンシン系に及ぼす影響  
高血圧症患者74例（本態性高血圧症56例、腎障害を伴う高血圧症患者18例）を対象に、カンデサルタン シレキセチル錠1日1回1～12mgの反復投与試験の結果、血漿レニン活性、血漿アンジオテンシンⅠ濃度及び血漿アンジオテンシンⅡ濃度の上昇がみられている<sup>4), 9), 10), 15), 16)</sup>。  
18.3 心行動態、腎機能及び脳血流量に及ぼす影響  
本態性高血圧症患者10例を対象に、カンデサルタン シレキセチル錠1日1回2～8mgの反復投与の結果、収縮期血圧、拡張期血圧の低下、左室心筋重量、末梢血管抵抗の減少がみられた他には、心拍出量、左室駆出分画等の心機能値には影響がみられない。本態性高血圧症患者11例にカンデサルタン シレキセチル錠1日1回2～8mgの反復投与の結果、降圧時にも腎血管抵抗、腎血流量、糸球体濾過値に影響はみられず、脳血管障害を有する本態性高血圧症患者15例に、カンデサルタン シレキセチル錠1日1回2～8mgの反復投与の結果、降圧時にも脳血流量に影響はみられない<sup>34)-36)</sup>。

18.4 慢性心不全患者の心行動態等に及ぼす影響  
慢性心不全の患者を対象に、カンデサルタン シレキセチル錠1日1回4mgを2～4週間投与し、その後1日1回8mgを24週間投与した二重盲検比較試験（プラセボ対照）の結果、アンジオテンシン変換酵素阻害剤で治療されているか、あるいは治療されたことがある患者に対しアンジオテンシン変換酵素阻害剤に替えてカンデサルタン シレキセチル錠又はプラセボを投与した場合、カンデサルタン シレキセチル錠投与群でカンデサルタン シレキセチル錠投与前に比し駆出分画の有意な増加及び心胸郭比の有意な減少がみられている。また、カンデサルタン シレキセチル錠投与群でプラセボ投与群に比し駆出分画の有意な増加及び心胸郭比の有意な減少がみられている<sup>28), 37)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：カンデサルタン シレキセチル  
(Candesartan Cilexetil)


化学名：(1*R*S)-1-(Cyclohexyloxy-carbonyloxy)  
ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)  
biphenyl-4-yl]methyl]-1*H*-benzimidazole-7-  
carboxylate

分子式：C<sub>33</sub>H<sub>34</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub>

分子量：610.66

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。酢酸（100）  
にやや溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、  
エタノール（99.5）に溶けにくく、水にほとんど溶  
けない。メタノール溶液（1→100）は旋光性を示さ  
ない。結晶多形が認められる。

化学構造式：



## 22. 包装

〈カンデサルタン錠2mg「ケミファ」〉

100錠 [10錠（PTP）×10]

〈カンデサルタン錠4mg「ケミファ」〉

100錠 [10錠（PTP）×10]

500錠 [ポリエチレンビン、バラ]

〈カンデサルタン錠8mg「ケミファ」〉

100錠 [10錠（PTP）×10]

500錠 [ポリエチレンビン、バラ]

〈カンデサルタン錠12mg「ケミファ」〉

100錠 [10錠（PTP）×10]

## 23. 主要文献

- 1) 阿部真也 他：周産期医学．2017；47：1353-1355
- 2) 齊藤大祐 他：鹿児島産科婦人科学会雑誌．2021；29：49-54
- 3) 大島洋次郎 他：薬理と治療．1996；24：S875-S888
- 4) 鈴木 伸 他：臨床医薬．1996；12：2413-2428
- 5) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店 2021：C1455-1461
- 6) 日本ケミファ株式会社：生物学的同等性に関する資料（社内資料）
- 7) 近藤孝浩 他：薬理と治療．1996；24（Suppl.6）：S915-S943
- 8) 代謝（ユニシア配合錠：2010年4月16日承認、申請資料概要2.7.2.3）
- 9) 青井 渉：臨床医薬．1996；12：2429-2441
- 10) 藤島正敏 他：臨床医薬．1996；12：3333-3352
- 11) 梶原英二 他：臨床医薬．1996；12：3353-3368
- 12) 安保泰宏 他：新薬と臨牀．1996；45：1662-1668
- 13) 慢性心不全患者を対象とした薬物動態及びジギタリスとの薬物相互作用（プロプレス錠：2005年10月11日承認、申請資料概要へ 1.（1）.1）
- 14) 藤原久義 他：臨床医薬．1996；12：3281-3297
- 15) 荒川規矩男 他：臨床医薬．1996；12：2195-2211
- 16) 荒川正昭 他：臨床医薬．1996；12：2267-2296
- 17) 荒川規矩男 他：臨床医薬．1996；12：2213-2230
- 18) 荒川規矩男 他：臨床医薬．1998；14：2765-2800
- 19) 猿田享男 他：臨床医薬．1996；12：2297-2322
- 20) 飯村 攻 他：臨床医薬．1996；12：2323-2341
- 21) 藤島正敏 他：臨床医薬．1996；12：2343-2371
- 22) 阿部圭志 他：臨床医薬．1996；12：2373-2392
- 23) 阿部圭志 他：臨床医薬．1996；12：2393-2411
- 24) 荒川規矩男 他：臨床医薬．1998；14：871-918
- 25) 梶山梧朗 他：臨床医薬．1996；12：3299-3317
- 26) 荻原俊男 他：臨床医薬．1996；12：3211-3228
- 27) 柊山幸志郎 他：臨床医薬．1996；12：3229-3264
- 28) 第Ⅲ相二重盲検比較試験（プロプレス錠：2005年10月11日承認、申請資料概要ト 1.（3））
- 29) 心血管系イベント（プロプレス錠：2005年10月11日承認、申請資料概要ト 2.（2）.5）
- 30) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店 2021：C1466-1474
- 31) 野田昌邦 他：薬理と治療．1996；24：2215-2220
- 32) 柴生田由美子 他：薬理と治療．1996；24：2207-2213

- 33) Wada T. et al.：Eur.J.Pharmacol. 1994；253：27-34
- 34) 三ツ浪健一 他：新薬と臨牀．1996；45：1655-1661
- 35) 伊勢拓之 他：臨床医薬．1996；12：3265-3280
- 36) 田川皓一 他：臨床医薬．1996；12：3319-3331
- 37) 心行動態及び心室リモデリングに対する改善効果（プロプレス錠：2005年10月11日承認、申請資料概要ト 2.（1）.3）

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ケミファ株式会社 安全管理部  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目2-3  
TEL 0120-47-9321 03-3863-1225  
FAX 03-3861-9567

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

 **日本ケミファ株式会社**  
東京都千代田区岩本町2丁目2-3