






ツロブテロールテープ「YP」の貼り方

- ①  切り口が**2箇所**あります。両方とも切って、テープを取り出してください。
※0.5mg, 1mg, 2mgのいずれも使い方は同じです。

- ②  「フィルム」と表示された面を上にして、**山折り**にしてください。

- ③  片方のフィルムを半分ほど浮かせ、浮いたフィルムの端をつまみ、はがしてください。この時、**テープを左右に強くひっぱらない**よう注意してください。また、**粘着面に指がふれない**よう注意してください。

- ④  もう片方のフィルム面を持ってテープを貼り、**軽く押さえ**、**フィルムをずらしながら**、残りのテープを貼ってください。この時、テープがカールするおそれがありますので、フィルムをあまり強くひっぱらないでください。

- ⑤  貼ったあとは、**手のひらで全体をしっかりと押さえ**てください。

保管上の注意

- ☆使用する前までは、袋を開けず、高温を避けて保管してください。
- ☆子供の手の届かないところに保管してください。

ツロブテロールテープ「YP」を使用されている方へ

使用方法の注意

このテープは、あなたの症状に合わせて処方されたお薬です。
主治医又は薬剤師の指示に従って正しく使用してください。

※このテープを家族や他の人にあげてはいけません。


貼る回数

このテープは**1日1回**、必ず貼りかえてください。


貼る部位

☆このテープは、胸、上腕、背中のいずれか1箇所に貼ってください。


胸



上腕



背中



☆貼る部位は乾いたタオル等でよく拭き、清潔にして使用してください。

☆このテープをはがしてしまう可能性のある子供には、手の届かないところに貼ってください。

☆傷口や湿疹のある部位には貼らないでください。

☆汗をかきやすい部位や、クリーム、軟膏等をぬった部位は、はがれやすくなるので貼らないでください。

☆同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、かぶれたりすることがありますので、新しいテープに貼りかえる時は、同じところを避けて貼ってください。

貼る時に注意すること

☆テープからフィルムをはがす時、強くひっぱらないでください。

強すぎると破れたり、カールしたりするおそれがあります。

☆粘着面に指がふれると粘着力が低下して、うまく貼れないことがあります。

☆テープは一度はがしたら、再び貼り直すことができません。

☆テープが少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定してください。

※このテープを使って、何か変だと感じるがあった時は、主治医又は薬剤師に相談してください。