

プレガバリンOD錠「ケミファ」を 服用される患者さんとそのご家族の方へ


あなたがお飲みになるお薬は ☒ チェック です。




プレガバリンOD錠
25mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)

表 裏



PTPシート



プレガバリンOD錠
75mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)

表 裏



PTPシート



プレガバリンOD錠
150mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)

表 裏



PTPシート



このお薬は、水なしでも服用できます。舌の上で唾液を含ませ、舌で軽くつぶして唾液と一緒に飲み込んでください。水で服用することもできます。

このお薬は神経の痛みに対するお薬です。

以下の方は使う前に必ず医師又は薬剤師にご相談ください。

- 腎臓が悪い方
- 透析をうけている方
- 心臓が悪い方
- 妊娠中または授乳中の方
- ほかのお薬を服用している方

服用にあたってのご注意

- このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。
 - 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
 - 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。
- 人により体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。

気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、
医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先



日本ケミファ株式会社