

リセドロン酸ナトリウム錠 17.5mg「ケミファ」の患者用指導箋は
以下 3 種類を掲載しております。

指導箋名	掲載頁
【骨粗しょう症用】 飲み方とご注意	2～3 頁
歯科・口腔外科を受診する場合はこのカードをご提示ください	4 頁
【骨ページット病用】 飲み方とご注意	5 頁

リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 を服用されている方へ

このお薬は**週1回1錠**をのむ骨粗しょう症のお薬です

- このお薬の服用により下記のような症状や異常を感じた場合は、すみやかに主治医、看護師、薬剤師にご相談ください。
 - ・食べ物がおみ込みにくい、おみ込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
 - ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など
 - ・あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など
- 歯科治療を受けられる方**は、必ず歯科医、口腔外科医にこの紙を見せてください。
(歯科・口腔外科の先生方へ:本剤はビスフォスフォネート系薬剤です)

●このお薬は**毎週1回1錠**を決められた曜日にのんでください(毎日のむお薬ではありません)。

●のみ忘れた場合には、気付いた日の翌朝に1錠をのんでください。次からは、あらかじめ決められた曜日にのんでください。

●同じ日に2錠をのまないでください。

●**朝**、起きたとき(食事前)に、1錠をコップ1杯(約180cc)の**水道水**かぬるま湯でのんでください。

●のんでから**30分間は横にならず、水以外の飲食、他のお薬の服用はさけて**ください。

●このお薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。

- | | |
|--|--|
| ☐ アクトネル錠 | ☐ ボンビバ(静注・錠) |
| ☐ ダイドロネル錠 | ☐ リクラスト点滴静注液 |
| ☐ フォサマック錠 | ☐ アレンドロン酸ナトリウム
(錠・点滴静注) |
| ☐ ペネット錠 | ☐ ミノドロン酸錠 |
| ☐ ボナロン
(錠・経口ゼリー・点滴静注) | ☐ リセドロン酸ナトリウム錠 |
| ☐ ボノテオ錠 | ☐ ゾレドロン酸点滴静注液 |
| ☐ リカルボン錠 | ☐ パミドロン酸二Na点滴静注用 |
| ☐ ソメタ点滴静注 | ☐ その他 <input type="text"/> |

年 月 日から **ビスホスホネート系薬剤**
(年 月 日まで) を使用しています



歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるので、拔牙等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

S-2307
2018年6月改訂

歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名(連絡先)



これからこの薬剤で 治療される患者さんへ



- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり拔牙などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。



この薬剤で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
- 定期的な歯科検査を受けてください。
- 拔牙などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。



- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

- あごの痛み
- 歯のゆるみ
- 歯ぐきの腫れ など

リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 を服用される患者様へ

のみ方とご注意

このお薬は**毎日1回1錠8週間**のむ
骨ページェット病のお薬です。

- のみ忘れた場合には、翌日の朝に1錠をのんでください。
ただし、食べ物、飲み物を口にしていない場合、他のお薬を
のんでいない場合には、すぐおのみください。
- 同じ日に2錠をのまないでください。
- 下記のような症状や異常を感じた場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。
 - ・食べ物がのみ込みにくい、のみ込むときにのどが痛い、胸に
痛みを感じる など
 - ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が
黄色くなる など
 - ・あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき
など
- 歯医者さんで診察を受ける場合は、必ずこの紙を見せてください。**
(歯科・歯科口腔外科の先生方へ:本剤はビスフォスフォネート系薬剤です)

毎日1回1錠8週間、下記の手順でのんでください。

- 朝起きたら(食事の前に)1錠をコップ1杯(約180cc)の水道水かぬるま湯でのんでください。
- のんでから少なくとも**30分間は、水以外の飲食はせず、他のお薬ものまないでください。**
- のんでから少なくとも**30分間は、横にならないでください。**
- このお薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。



日本ケミファ株式会社



日本薬品工業株式会社