

- 歯医者さんで診察を受ける場合は、必ずこの紙を見せてください。

〈歯科・歯科口腔外科の先生方へ〉

本剤はビスフォスフォネート系薬剤です。

リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」

のみ方とご注意

1A1

- 毎日1回1錠、朝起きたらすぐ(食事前)にのんでください。
- コップ1杯(約180cc)の水でのんでください。
また、お薬を口の中で溶かしたり、かんだりしないでください。

※水道水やぬるま湯でのんでください。

- のんでから30分間は水以外の飲食はせず、他のお薬ものまないでください。
- のんでから30分間は横にならないでください。

(裏面に続く)

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> アクトネル錠 | <input type="radio"/> ボンビバ(静注・錠) |
| <input type="radio"/> ダイドロネル錠 | <input type="radio"/> リクラスト点滴静注液 |
| <input type="radio"/> フォサマック錠 | <input type="radio"/> アレンドロン酸ナトリウム
(錠・点滴静注) |
| <input type="radio"/> ペネット錠 | <input type="radio"/> ミノドロン酸錠 |
| <input type="radio"/> ボナロン
(錠・経口ゼリー・点滴静注) | <input type="radio"/> リセドロン酸ナトリウム錠 |
| <input type="radio"/> ボノテオ錠 | <input type="radio"/> ソレドロン酸点滴静注液 |
| <input type="radio"/> リカルボン錠 | <input type="radio"/> パミドロン酸二Na点滴静注用 |
| <input type="radio"/> ソメタ点滴静注 | <input type="radio"/> その他 <input type="text"/> |

年 月 日から **ビスホスホネート系薬剤**
(年 月 日まで) を使用しています



歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるので、抜歯等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

S-2307
2018年6月改訂

歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名(連絡先)



これからこの薬剤で 治療される患者さんへ



- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。



この薬剤で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
- 定期的な歯科検査を受けてください。
- 抜歯などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。



- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

- あごの痛み
- 歯のゆるみ
- 歯ぐきの腫れ など