

ロスバスタチンOD錠「ケミファ」 を服用される患者様へ

本剤は、血液中のコレステロールを減らすおくすりです。

このおくすりは、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

- ◎筋肉が痛い
- ◎手足の力が
入らない
- ◎尿の色が濃い
(赤褐色になる)

(裏面につづく)

副作用はどんなおくすりにもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。

また、他にもおくすりを服用して体調がおかしいと感じたら、先生にご相談下さい。

*「横紋筋融解症」とは：
筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

製造販売元

日本ケミファ株式会社

S-2193

ロスバスタチンOD錠「ケミファ」を 服用される患者さんへ

あなたがお飲みになるお薬は☑です



ロスバスタチンOD錠 2.5mg「ケミファ」

錠剤（実物大）



表面 裏面 側面



ロスバスタチンOD錠 5mg「ケミファ」

錠剤（実物大）



表面 裏面 側面



- このお薬は舌の上にのせると唾液で溶けますが、口の粘膜から吸収されること
はないので、唾液または水で飲み込んでください。

このお薬は血液中のコレステロールを下げるお薬です

- 以下の方は使う前に必ず医師又は薬剤師に相談してください。

- 以前にお薬を飲んでかゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことがある人
- 肝臓、腎臓、甲状腺、または筋肉の病気にかかっている人
- 妊婦または妊娠している可能性がある、または授乳中である人
- 他のお薬を飲んでいいる人

- ご自分の判断でこのお薬の服用を中止しないでください。医師または薬剤師
の指示を守って服用してください。

服用されるときに注意していただきたいこと

- 筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」* が起こることがあります。次のような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- 筋肉が痛い
- 手足に力が入らない
- 尿の色が赤褐色になる

*「横紋筋融解症」とは・・・筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる）になることもあります。

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。決して2回分を1度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

- 副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。
- ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- お薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

