

患者指導せん変更のご案内

骨粗鬆症治療剤

劇薬
処方せん医薬品

アレンドロン酸錠35mg「DK」

(日本薬局方 アレンドロン酸ナトリウム錠)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記製品につきまして、下記変更を行いましたのでご案内申し上げます。

なお、当該変更品の出荷時期に関しましては、多少変動することもあるかと存じますが、何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご案内が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

今後ともお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

患者指導せんの記載内容及び記載位置を変更しました。

①歯科治療を受ける際の注意を追記しました。

②服用時の「水」についての注意書きを修正しました。

変更前

表面	裏面
アレンドロン酸錠35mg「DK」を 服用される患者さんへ このおくすりは週1回1錠のむおくすりです。 (毎日のむおくすりではありません。) 1週間のうち都合の良い日を決めてください。 毎週1回、決められた日に1錠を裏面の手順でおのみください。 ●胸やけ、嚥下時の痛み、のみ込みにくさを感じた場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。 ●もしのみ忘れた場合には、気づいた日の翌朝に1錠をおのみください。次からは、決められた日におのみください。決して同じ日に2錠をのまないでください。 ●のみ方についてご質問がある場合には、主治医または薬剤師にご相談ください。	おくすりの効果を最大限に引き出し、口の中や食道への副作用を減らすため、次ののみ方を必ず守ってください。 ●朝、起きた時(食事の前)に1錠をコップ1杯(約180cc)の水(水道水や硬度の低いミネラルウォーター)と一緒にのおのみください。 ●のんでから少なくとも30分間は横にならず、水以外の飲食、他のおくすりの服用はさけてください。 (のんでから30分以上過ぎて横になる場合は、最初の食事をとってからにしてください。) ●このおくすりをかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。



変更後

表面	裏面
アレンドロン酸錠35mg「DK」を 服用される患者さんへ このおくすりは週1回1錠のむおくすりです。 (毎日のむおくすりではありません。) 1週間のうち都合の良い曜日を決めてください。 毎週1回、決められた曜日に1錠をおのみください。 ●朝、起きた時(食事の前)に1錠をコップ1杯(約180cc)の水(水道水または硬度300mg/L以下のミネラルウォーター)と一緒にのおのみください。 ●のんでから少なくとも30分間は横にならず、水以外の飲食、他のおくすりの服用はさけてください。 (のんでから30分以上過ぎて横になる場合は、最初の食事をとってからにしてください。) ●このおくすりをかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。	アレンドロン酸錠35mg「DK」 服用時の注意 おくすりの効果を最大限に引き出し、口の中や食道への副作用を減らすため、表面の「のみ方」を必ず守ってください。 ●胸やけ、嚥下時の痛み、のみ込みにくさを感じた場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。 ●もしのみ忘れた場合には、気づいた日の翌朝に1錠をおのみください。次からは、決められた曜日におのみください。決して同じ日に2錠をのまないでください。 ●のみ方についてご質問がある場合には、主治医または薬剤師にご相談ください。 ●歯医者と診察を受ける場合は、必ずこのおくすりをのんでいることをお伝えください(この紙を見せてください)。 歯科・歯科口腔外科の先生へ 本剤はビスホスホネート系薬剤です。

②「水」について
の注意書き①歯科治療
を受ける際の
注意

裏面もご覧ください

2. 変更品出荷予定等

包装単位	変更前最終ロット番号	切換ロット番号	弊社出荷予定
20錠 (2錠×10)	CM01 (使用期限:2016年12月)	CP01 (使用期限:2017年2月)	2014年9月上旬

●切換ロットの個装箱には、「患者指導せん変更品」と記載しております。

以上