

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

# 「使用上の注意」改訂のお知らせ

平成27年7月



潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

処方箋医薬品

## メサラジン錠250mg「ケミファ」 メサラジン錠500mg「ケミファ」 メサラジン製剤

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記製品の「使用上の注意」の記載内容を下記のとおり自主改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

敬具

### 記

<改訂内容（2015年7月改訂）>（該当部分のみ抜粋）

「副作用」の「その他の副作用」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

\_\_\_\_\_：追記箇所

改訂後	改訂前												
<p>4. 副作用 省略（現行通り） (2) その他の副作用 省略（現行通り）</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td>省略（現行通り）</td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td>発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい、<u>胸部痛、頸部痛</u></td></tr></table>		頻度不明	省略（現行通り）		その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい、 <u>胸部痛、頸部痛</u>	<p>4. 副作用 省略 (2) その他の副作用 省略</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td>省略</td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td>発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい</td></tr></table>		頻度不明	省略		その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい
	頻度不明												
省略（現行通り）													
その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい、 <u>胸部痛、頸部痛</u>												
	頻度不明												
省略													
その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい												

上記の改訂内容を踏まえ、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

以上

《今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.241（2015年7月）に掲載される予定です。なお、改訂後の添付文書はPMDAホームページの「医薬品に関する情報」（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）及び弊社ホームページの「医療関係者向けサイト」（<http://www.nc-medical.com/>）に掲載致します。》